

Nplate® (Romiplostim)

¿Qué es y para qué se utiliza?

La trombopenia (número de plaquetas en sangre) aumenta el riesgo de sufrir hemorragias. Romiplostim es una proteína que estimula la producción de plaquetas.

Nombres y presentaciones comerciales

Nplate 250 mcg polvo y disolvente para solución inyectable
Nplate 500 mcg polvo y disolvente para solución inyectable

¿Cómo se debe conservar?

Mantener el envase en el embalaje exterior, para preservarlo de la luz. Conservar en nevera (2°C y 8°C). No congelar.

Si las jeringas no pueden conservarse en nevera, a temperatura ambiente (hasta 25°C) tienen una validez de 24 horas. Después de este periodo, el producto no debe volver a refrigerarse y debe desecharse.

¿Cómo se administra?

La dosis habitual es una inyección subcutánea (bajo la piel). La dosis se calcula en función de su peso corporal y las analíticas, y se administra una vez a la semana.

El medicamento se presenta en polvo en un vial, y se debe reconstituir con el disolvente que aporta. Al añadir el disolvente al vial, debe realizar movimientos circulares suaves, no agitar. Deje reposar el vial con el disolvente 2 minutos.

- Lávese las manos.
- Utilice una jeringa graduada. Coloque la aguja en la jeringa.
- Cargue la dosis en mililitros que le haya indicado su médico.
- Desinfecte la piel con alcohol y pellizque la piel con el pulgar e índice. Inserte la aguja formando un ángulo de 45°.
- Empuje el émbolo lentamente, manteniendo la piel pellizcada.
- Retire la aguja y deseche la jeringa en recipientes adecuados para ello, y puede solicitarlos a su médico, enfermero o farmacéutico.

Para mayor información recomendamos ver el video demostrativo de la administración.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Nplate® puede producir efectos adversos, siendo los más frecuentes: aumento del sangrado tras suspender el tratamiento, complicaciones de la circulación, erupción, urticaria, cefalea e infecciones respiratorias. Comunique a su médico cualquier otro efecto adverso que aprecie tras la administración de Nplate®.

Uso de otros medicamentos

No tome por su cuenta ningún medicamento. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.



Advertencias

No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de romiplostim en mujeres embarazadas y con lactancia materna.

Tenga especial cuidado con la dosis a administrar, se han producido errores de dosis al administrar una dosis errónea.

Al interrumpir el tratamiento con romiplostim pueden aparecer hemorragias de rebote, siga un control estricto y tome la medicación que le haya indicado su médico para evitar hemorragias.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,

Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS, DEVUELVALOS POR
FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**