

Targretin[®] (Bexaroteno)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Targretin[®] está indicado en el tratamiento de las manifestaciones cutáneas de pacientes en estadios avanzados de linfoma cutáneo de células T. Bexaroteno disminuye el crecimiento de las células tumorales.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Targretin[®] 75mg cápsulas

Cápsula blanquecina, rellena con una suspensión líquida e impresa con la palabra “Targretin”.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

Se administra vía oral. La dosis inicial recomendada es de 300mg/m² /día, y si es necesario se modificará en función de los efectos secundarios.

Las cápsulas de Targretin[®] se deben tomar en dosis única oral diaria con una comida. La cápsula no se debe masticar.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?



Si olvidó tomar una dosis, tome la dosis diaria con la comida siguiente en el mismo día, y tome la dosis normal al día siguiente. No tome una dosis doble en un solo día para compensar las dosis olvidadas en el día anterior.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Targretin[®] se encuentran: hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hipotiroidismo, cefalea, picor, erupción y dolor.



Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Targretin[®] cuando se administran conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. De igual modo, Targretin[®] puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

No conduzca sin consultar con su médico y/o farmacéutico.

Lea la sección “Conducción y uso de máquinas” en el prospecto del medicamento y consúltele cualquier duda.



Embarazo:

Está contraindicada la administración de Targretin® en pacientes embarazadas.

Las mujeres y hombres en edad fértil deben asegurarse de utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y hasta 1 mes tras finalizar el tratamiento.

Lactancia:

Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Targretin®

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**