

Inlyta® (Axitinib)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Inlyta® está indicado en el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma avanzado de células renales tras fracaso a un tratamiento previo con sunitinib o citoquinas.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Inlyta 5 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimido oval recubierto con película, de color rojo, con "Pfizer" grabado en una cara y "1 XNB" en la otra.

¿Cómo se debe conservar?

No requiere condiciones especiales de conservación (menos de 25°C).



¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

Axitinib se administra por vía oral dos veces al día, cada 12 horas aproximadamente, con o sin alimentos. Los comprimidos de axitinib se deben tragar enteros con un vaso de agua.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si el paciente olvida tomar una dosis, tómela en cuanto lo recuerde teniendo en cuenta que deben pasar al menos 6 horas entre las dosis. Si faltan menos de 6h para tomar la próxima dosis no tome la dosis olvidada y espere a tomar la dosis siguiente en la hora habitual y continúe la pauta normal.

No tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las reacciones adversas más frecuentemente observadas en el tratamiento con axitinib fueron diarrea, hipertensión, fatiga, apetito disminuido, náuseas, peso disminuido, disfonía, síndrome de eritrodisestesia palmoplantar (síndrome mano-pie), hemorragia, hipotiroidismo, vómitos, proteinuria, tos y estreñimiento.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Inlyta® cuando se administran conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. De igual modo, Inlyta® puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Excipientes de declaración obligatoria

Contiene lactosa.

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de máquinas”



Embarazo:

No debe utilizarse axitinib durante el embarazo a no ser que la situación clínica de la mujer requiera tratamiento con este medicamento.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante y hasta 1 semana tras finalizar el tratamiento.

Lactancia:

Axitinib no debe utilizarse durante la lactancia.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**