



Avonex® (interferón beta-1a)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Interferón beta-1a es un fármaco que modifica el modo en que funciona el sistema inmunitario de su cuerpo (se clasifica como un agente inmunomodulador) utilizado para el tratamiento de la esclerosis múltiple.

Reduce el número de veces que usted sufre ataques de esclerosis múltiple (recaídas).

Nombres y presentaciones comerciales

Avonex 30 mcg/0,5 ml solución inyectable, caja de 4 plumas precargadas de 0,5 ml + 4 agujas

¿Cómo se debe conservar?

Mantener el envase en el embalaje exterior, para preservarlo de la luz
Conservar en nevera (2°C y 8°C). (NUNCA en el congelador)

Si las jeringas no pueden conservarse en nevera, a temperatura ambiente (15-30°C) tienen una validez de una semana.



¿Cómo se administra?

Utilice Avonex® de la forma prescrita por su médico. La dosis habitual es de 30 mcg (0,5 mL), administrado una vez por semana, inyectada por vía intramuscular. Saque Avonex Pen de la nevera y deje que se atempere unos 10-15 minutos.

Lávese las manos con agua y jabón y limpie con una toallita empapada con alcohol la zona donde se va a realizar la inyección.

Retire la cápsula de garantía de cierre. Conecte la aguja. Gire la aguja en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede firmemente acoplada.

Extender el protector del inyector. El protector plástico de la aguja se desprenderá.




Compruebe que la pantalla del inyector está completamente extendida y que el líquido es transparente e incoloro.

Sujete la pluma firmemente sobre la piel con un ángulo de 90°

Presione el botón azul y cuente hasta 10 lentamente

Retire la pluma y verifique que la ventana está amarilla, esto significa que la administración ha sido completa.



Se recomienda cambiar cada semana el punto de inyección intramuscular. La mejor zona es la parte externa del muslo. Alterne entre el muslo izquierdo y el derecho.

Para mayor información recomendamos ver el video demostrativo de la administración.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se salta la dosis semanal habitual, inyéctese una dosis lo antes que pueda. A continuación debe dejar pasar una semana antes de volver a utilizar Avonex®. Siga inyectándose cada semana en este día “nuevo”. No duplique la dosis para compensar la inyección que se ha saltado.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- Reacciones en el lugar de la inyección: inflamación, dolor, enrojecimiento, etc.
- Reacciones muy frecuentes: síndrome pseudogripal (fiebre, escalofríos, dolor en articulaciones y músculos...) y dolor de cabeza. Su médico o farmacéutico le aconsejara algunas medidas para disminuir los síntomas pseudogripales asociados con la administración de Avonex. Antes de la inyección, y durante un período adicional de 24 horas tras cada inyección, se aconseja el uso de un analgésico antipirético. Estos síntomas generalmente se presentan durante los primeros meses de tratamiento.
- Reacciones frecuentes: Pérdida del apetito, cansancio, dificultad para dormir, depresión, diarrea, náuseas, vómitos, erupción y hematomas cutáneos.

Contacte con su médico inmediatamente si usted presenta ictericia (color amarillento en piel o en mucosas), náuseas o vómitos intensos, dificultad para respirar, picor intenso, hinchazón en cara o lengua, dolor abdominal, palpitaciones, convulsiones, taquicardia o ideas suicidas.

Uso de otros medicamentos

No tome por su cuenta ningún medicamento. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento, especialmente en el caso de antiepilépticos y/o antidepresivos.

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de máquinas”

Embarazo



Avonex puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo. El inicio del tratamiento durante el embarazo está contraindicado. Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos.



Otros

Antes de iniciar tratamiento comunique a su médico si usted ha padecido trastornos depresivos, convulsiones, alteraciones tiroideas, o daño hepático.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, DEVUELVALOS POR FAVOR AL
SERVICIO DE FARMACIA.**