

## Enbrel® (Etanercept) Pluma precargada



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Enbrel® está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica, espondiloartritis axial, psoriasis en placas y psoriasis pediátrica en placas.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Enbrel® 25mg/mL, solución inyectable en pluma precargada.

Enbrel® 50mg/mL, solución inyectable en pluma precargada.


### ¿Cómo se debe conservar?

Conserve Enbrel® en la nevera, entre 2°C y 8°C (NUNCA en el congelador).



### ¿Cómo se administra?

Siga las indicaciones de su médico.



Se inyecta bajo la piel (vía subcutánea).

Las zonas de inyección son el abdomen, los muslos y parte exterior superior del brazo

Se recomienda sacar de la nevera unos 15-20 minutos antes de administrarse.

Lávese las manos antes de manipular Enbrel®.




La pluma se presenta lista para administrar, contiene una solución incolora y transparente.

Limpie la zona de inyección con una toallita impregnada de alcohol. Espere a que se evapore el alcohol antes de la inyección.

Retire el capuchón de la pluma.

Coloque la pluma formando un ángulo recto respecto a la piel. Empuje el extremo de la pluma de forma firme de modo que el revestimiento de la aguja quede introducido por completo.



Presione e **inmediatamente suelte** el botón **verde** de la parte superior de la pluma con el dedo pulgar para iniciar la administración de la dosis. Al presionar el botón oirá un "click".

Continúe sujetando la pluma de manera firme contra la piel en la posición indicada hasta que oiga un segundo "click" (10-15 segundos).



Levante la pluma. La ventana de inyección debe estar completamente violeta, lo que confirma que la dosis se ha administrado correctamente.

Tras la inyección, presione con un algodón o gasa el sitio de inyección durante unos segundos, NO frote.

Recuerde que la pluma es de un único uso.

Deseche la pluma en los contenedores especiales que se le entregan para ello.



### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se le olvida una dosis, deberá inyectarla tan pronto como usted lo recuerde, a no ser que la próxima dosis esté programada para el día siguiente, en cuyo caso deberá omitir la dosis olvidada. A continuación, continúe inyectando el medicamento en el(los) día(s) habitual(es). Si no lo recuerda hasta el día en que debe administrarse la dosis siguiente, no se inyecte una dosis doble (dos dosis en el mismo día) para compensar la dosis olvidada. **Nunca se administre una dosis doble para compensar un olvido.**

### **¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?**

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento se encuentran:

- Síndrome pseudogripal (fiebre, dolor de cabeza...). Puede llegar a corregirse en poco tiempo.
- Aparición de infecciones de forma más frecuente (se pueden manifestar con fiebre, malestar general, problemas dentales, escozor al orinar, tos).
- Llagas en la boca. Debe extremar las pautas de higiene buco-dental.



Avise a su médico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

### **Uso de otros medicamentos**

Enbrel® puede administrarse solo o junto con metotrexato, esteroides o medicamentos para el dolor, incluidos los antiinflamatorios.

Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento, consulte al médico antes de ser vacunado.



No tome por su cuenta ningún medicamento.

### **Advertencias**



No se recomienda la administración de Enbrel® durante el embarazo. A las mujeres en edad fértil se les recomienda utilizar un método anticonceptivo adecuado para prevenir el embarazo y continuar su uso durante al menos tres semanas tras el último tratamiento con Enbrel®.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMAC**

IA.



