

## **Menopur® (Menotropina)**



### **¿Qué es y para qué se utiliza?**

- Menopur® está indicado en esterilidad en mujeres con insuficiencia ovárica hipo o normogonadotrópica: estimulación del crecimiento folicular. Inducción de la ovulación, seguida o no de inseminación artificial (anovulación, incluyendo síndrome de ovario poliquístico en mujeres que no han respondido al tratamiento con citrato de clomifeno).
- Menopur® está indicado en técnicas de reproducción asistida realizadas mediante hiperestimulación ovárica controlada para inducir el desarrollo de folículos múltiples.
- Menopur® está indicado en esterilidad en hombres con hipogonadismo hipo o normogonadotrópico: en combinación con hCG para estimular la espermatogénesis

### **Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital**


- Menopur® 600 UI: Cada vial de polvo contiene menotropina equivalente a 600 UI de actividad FSH y 600 UI de actividad LH.
- Menopur® 1200 UI: Cada vial de polvo contiene menotropina equivalente a 1200 UI de actividad FSH y 1200 UI de actividad LH.

### **¿Cómo se debe conservar?**

Conservar Menopur® en la nevera, entre 2°C y 8°C (NUNCA en el congelador).  
Conservar en su embalaje original para protegerlo de la luz.

### **¿Cómo se administra?**

Siga las indicaciones de su médico sobre la dosis a administrar.




Se inyecta bajo la piel (vía subcutánea).  
Las zonas de inyección son el abdomen y los muslos.

Se recomienda sacar de la nevera unos 10-15 minutos antes de administrarse.  
Lávese las manos antes de manipular Menopur®.



Ajuste firmemente la aguja larga y delgada (aguja de preparación/ reconstitución)  
Abra la ampolla del disolvente con el punto mirando hacia usted, inserte la aguja en la ampolla de disolvente y retire todo el líquido.

Inserte la aguja a través del tapón de goma del vial de polvo e inyecte suavemente todo el líquido. Hágalo en un lado del vial, para evitar la formación de burbujas. El polvo se disolverá rápidamente (en 2 minutos) formando una solución transparente. Para ayudar a la disolución del polvo, remueva la solución, **sin agitar**. No debe utilizar la solución reconstituida si contiene partículas o si no está transparente



Retire la solución con la jeringa.

Una vez tenga su dosis prescrita retirada en la jeringa, cambie la aguja (de preparación/ reconstitución) por una aguja corta y delgada (aguja de inyección).

Coloque la jeringa boca arriba y golpéela suavemente para que las burbujas de aire se queden en la parte superior. Empuje despacio el émbolo hasta que salga todo el aire y aparezca en la punta de la aguja una gota de la solución. Desinfecte el lugar de la inyección.



Para inyectar, pellizque la piel para producir un pliegue, e inserte la aguja en un movimiento rápido a 90 grados del cuerpo. Presione el émbolo para inyectar la disolución, y después retire la aguja. Tras retirar la aguja, aplique presión al lugar de inyección para evitar el sangrado. Un masaje cuidadoso en el lugar de inyección ayudará a dispersar la solución bajo la piel.



Desenrosque las agujas y deposite el material en los contenedores especiales que se le entregan para ello.



**¿Qué hacer si se olvida una dosis?**

Si olvidó la administración de Menopur® contante con su médico.  
No se administre una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

**¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?**

Son frecuentes las reacciones locales en el punto de inyección (enrojecimiento, picor, dolor e inflamación). Puede aparecer cefalea, dolor de pelvis, dolor de estómago y/o distensión abdominal. Otro efecto adverso que puede aparecer es conocido como síndrome de hiperestimulación ovárica caracterizado dolor en la región inferior del abdomen acompañado de náuseas o vómitos.



Avise a su médico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

**Advertencias**



En pacientes sometidas a inducción ovárica, la incidencia de embarazo, partos múltiples o abortos es más elevada que en caso de concepción natural.

No hay ninguna indicación para usar Menopur® durante el embarazo. Menopur® puede afectar a la producción de leche, consulte a su médico antes de usar Menopur® durante la lactancia.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**