

Hycamtin® (Topotecan)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Hycamtin® está indicado en el tratamiento de cáncer de pulmón de célula pequeña que ha vuelto a aparecer después de recibir quimioterapia y en el tratamiento de carcinoma metastásico de ovario.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Hycamtin® 0,25mg cápsulas duras. Cápsulas duras de color blanco a blanco amarillento, opacas, e impresas con "HYCAMTIN" y 0,25 mg

Hycamtin® 1 mg cápsulas duras. Cápsulas duras de color rosa, opacas, e impresas con "HYCAMTIN" y 1 mg.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar **en nevera (entre 2°C y 8°C)** en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. No congelar.



¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico. El número de cápsulas prescritas deben tragarse enteras, una vez al día durante cinco días.






Hycamtin® cápsulas puede tomarse **con o sin alimentos**. Las cápsulas no deben ser abiertas o machacadas.

Extraer una cápsula

Estas cápsulas vienen en un envase especial para evitar que los niños las extraigan.

1. **Separar una cápsula:** rasgar a lo largo de las líneas de corte para separar un alveolo de la tira.
2. **Quitar la lámina externa:** levantar y retirar la lámina que cubre el alveolo, a partir de la esquina coloreada.
3. **Sacar la cápsula:** empujar con cuidado un extremo de la cápsula a lo largo de la lámina de aluminio.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si el paciente olvida tomar una dosis, tómela en cuanto lo recuerde teniendo en cuenta que deben pasar al menos 6 horas entre las dosis. Si faltan menos de 6h para tomar la próxima

dosis no tome la dosis olvidada y espere a tomar la dosis siguiente en la hora habitual y continúe la pauta normal.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Hycamtin® se encuentran: anemia, neutropenia febril, náuseas, vómitos, diarrea, mucositis, estreñimiento, alopecia, fiebre, fatiga.



Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta o cualquier medicamento a base de plantas.

Puede haber una mayor probabilidad de que sufra efectos adversos si está siendo tratado también con ciclosporina A. Será controlado mientras esté tomando estos dos medicamentos

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Excipientes de declaración obligatoria

Este medicamento contiene pequeñas cantidades de etanol (alcohol).

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de máquinas”



Embarazo:

No se recomienda utilizar Hycamtin® en mujeres embarazadas, puesto que puede provocar daños en el niño concebido antes, durante o poco después del tratamiento. Debe utilizar un método anticonceptivo eficaz. No intente quedarse embarazada o ser padre hasta que su médico le indique que es seguro hacerlo.

Los hombres que deseen ser padres, deben pedir consejo a su médico sobre planificación familiar.

Lactancia:

Evite la lactancia si está siendo tratada con Hycamtin®. No reanude la lactancia hasta que el médico le indique que es seguro hacerlo.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**