

Iressa® (Gefitinib)



¿Qué es y para qué se utiliza?

IRESSA está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico localmente avanzado o metastásico con mutaciones activadoras de EGFR-TK.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Iressa® 250mg comprimidos recubiertos. Los comprimidos son marrones, redondos, biconvexos, impresos con "IRESSA 250" por un lado y lisos por el otro.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad.



¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

El comprimido se puede tomar vía oral **con o sin alimentos**, aproximadamente a la misma hora cada día.



El comprimido puede ser tragado entero con agua o si la administración de los comprimidos enteros no es posible, pueden ser administrados como una dispersión en agua (no carbonatada). No deben usarse otros líquidos. Sin tritularlo, se debe echar el comprimido en medio vaso de agua. Se debe remover el vaso de vez en cuando, hasta que el comprimido se disperse (esto puede llevar hasta 20 minutos) y se debe beber inmediatamente después de que se haya completado la dispersión. El vaso se debe enjuagar con medio vaso de agua, que debe beberse también. La dispersión puede ser administrada también a través de sonda nasogástrica o de gastrostomía.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se olvida una dosis, debe tomarse tan pronto como el paciente se acuerde. Si hasta la siguiente dosis existe un periodo menor de 12 horas, el paciente no debe tomar la dosis olvidada. Los pacientes no deben tomar una dosis doble (dos dosis al mismo tiempo) para compensar la dosis olvidada.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Iressa® se encuentran: anorexia, diarrea, vómitos, náuseas, estomatitis, reacciones cutáneas, principalmente rash pustuloso y astenia



Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Iressa® cuando se administran conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. De igual modo, Iressa® puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Excipientes de declaración obligatoria

Contiene lactosa.

Advertencias

Embarazo:

IRESSA no debe usarse durante el embarazo a menos que sea claramente necesario.

Lactancia:

Debe interrumpirse mientras se esté recibiendo tratamiento con este medicamento

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA**