

## Nexavar® (Sorafenib)



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Nexavar® está indicado en el tratamiento del carcinoma hepatocelular, carcinoma de células renales o en carcinoma diferenciado de tiroides.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Nexavar® 200mg comprimidos recubiertos.

Comprimidos rojos, redondos, biconvexos, recubiertos con película y marcados con la cruz de Bayer en una cara y "200" en la otra.

### ¿Cómo se debe conservar?

No conservar a temperatura superior a 25°C.

### ¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

Se administra vía oral. La dosis recomendada de en adultos es de 400 mg de sorafenib (dos comprimidos de 200 mg), tomados dos veces al día.

Se recomienda administrar sorafenib **fuera de las comidas o con una comida moderada o baja en grasas**. Si tiene intención de tomar una comida rica en grasas, deben administrarse los comprimidos de sorafenib al menos 1 hora antes o 2 horas después de la comida. Los comprimidos deben tomarse con un vaso de agua.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Nexavar se encuentran: diarrea, fatiga, alopecia, infección, reacción cutánea mano-pie y exantema.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

### Uso de otros medicamentos

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antifúngicos (para tratar infecciones por hongos): ketoconazol, itraconazol, voriconazol,
- Antibióticos: telitromicina, claritromicina, eritromicina, rifampicina.
- Antiepilépticos: fenobarbital, fenitoína, carbamazepina.
- Antiulcerosos: omeprazol, ranitidina.
- Anticoagulantes: acenocumarol, warfarina.
- Otros: digoxina, dexametasona,
- Hierba de San Juan o hipérico.
- Zumo de pomelo.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

### **Advertencias**

#### **Lactancia:**

Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento con sorafenib.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**