

## Tafinlar® (Dabrafenib)



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Tafinlar® se utiliza en adultos para tratar un tipo de cáncer de piel llamado **melanoma**, que tiene un cambio (mutación) concreto en un gen llamado "BRAF", y que se ha extendido a otras partes del cuerpo o no puede ser eliminado por cirugía.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Tafinlar® 50mg cápsulas duras.

Cápsulas opacas de color rosa oscuro, de aproximadamente 19 mm de longitud, impresas con 'GS LHF' y '75 mg' o bien '50 mg'.

### ¿Cómo se debe conservar?

Este medicamento no requiere condiciones especiales de almacenamiento.



### ¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

La dosis recomendada de Tafinlar® es de **2 cápsulas de 75 mg dos veces al día** (lo que equivale a una dosis diaria de 300 mg). Tome sus dosis de la mañana y de la noche a la misma hora del día, todos los días. Esto aumentará la probabilidad de que recuerde tomar las cápsulas.

Si toma Tafinlar® junto con Mekinist® (trametinib), en una de las tomas debe tomar los 2 fármacos a la vez.

Tome las cápsulas enteras, con agua, una tras otra. No mastique o rompa las cápsulas, ya que perderán su efecto.

Tome Tafinlar® **con el estómago vacío**, debe esperar por lo menos 1 hora antes de comer o, si ha comido, debe esperar por lo menos 2 horas antes de tomar Tafinlar®.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?



Si han transcurrido menos de 6 horas desde la hora habitual a la que debería haber tomado Tafinlar, tómelo tan pronto como se acuerde.

Si han transcurrido más de 6 horas desde la hora habitual a la que debería haber tomado Tafinlar®, sátese esta dosis y tome la siguiente a su hora habitual. Luego, continúe tomando las cápsulas a sus horas habituales.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Tafinlar® se encuentran: cefalea, fiebre, dolor en articulaciones, fatiga, náusea, papiloma, alopecia, erupción cutánea y vómitos.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.



### **Uso de otros medicamentos**

Algunos medicamentos pueden afectar la forma de actuar de Tafinlar<sup>®</sup>, o hacer que sea más probable que tenga efectos adversos. Algunos medicamentos que pueden interactuar con dabrafenib y deben evitarse son: ketoconazol, gemfibrozilo, nefazodona, claritromicina, ritonavir, saquinavir, telitromicina, itraconazol, voriconazol, posaconazol, atazanavir, rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, o Hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*).

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

### **Advertencias**

#### **Embarazo:**



No se recomienda utilizar Tafinlar<sup>®</sup> durante el embarazo ya que posiblemente podría dañar al feto.

#### **Lactancia:**

No se recomienda utilizar Tafinlar<sup>®</sup> durante la lactancia. Se desconoce si los componentes de este medicamento pueden pasar a la leche materna.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**