Tarceva®
(Erlotinib)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Tarceva® es un medicamento utilizado para tratar el cáncer y actúa impidiendo la actividad de una proteína llamada receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).
Tarceva® está indicado en el tratamiento de pacientes con **cáncer de pulmón no microcítico** localmente avanzado o metastásico con mutaciones activadoras de EGFR. Tarceva® en combinación con gemcitabina está indicado en el tratamiento de pacientes con **cáncer de páncreas metastásico**.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Tarceva® 100 mg comprimidos recubiertos con película.
Tarceva® 150 mg comprimidos recubiertos con película.
Comprimido recubierto con película de color blanco a amarillento, redondos, biconvexos, con el grabado “T 100” en negro o “T150” en rojo en una cara.

¿Cómo se debe conservar?

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación (menos de 25ºC).

¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

Tome Tarceva® **con el estómago vacío**. El comprimido debe tomarse al menos una hora antes o dos horas después de haber ingerido alimentos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar una o más dosis de Tarceva®, contacte tan pronto como pueda con su médico o farmacéutico.
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Tarceva® se encuentran: diarreas y vómitos, irritación de los ojos debido a conjuntivitis, queratitis, erupciones que pueden aparecer o empeorar en zonas expuestas al sol, infecciones, pérdida de apetito, pérdida de peso, depresión, dolor de cabeza, alopecia, entumecimiento en las extremidades, dificultad al respirar, tos, náuseas, irritación de la boca, dolor de estómago, indigestión y flatulencia.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Tarceva® cuando se administran conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo: antifúngicos, inhibidores de la proteasa, eritromicina, claritromicina, fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, rifampicina, ciprofloxacino, omeprazol, ranitidina, Hipérico (Hierba de San Juan), anticoagulantes (sintrom®), estatinas, capecitabina. De igual modo, Tarceva® puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.

Debe dejar de fumar lo antes posible antes de iniciar el tratamiento con Tarceva®, puesto que, de lo contrario, la concentración plasmática de erlotinib será más reducida, y el efecto de Tarceva® puede disminuir.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Excipientes de declaración obligatoria

Contiene lactosa.

Advertencias

Embarazo:
Evite quedarse embarazada mientras tome Tarceva®. Si puede quedarse embarazada, utilice métodos anticonceptivos adecuados durante el tratamiento y durante, al menos, las 2 semanas siguientes a la toma del último comprimido de Tarceva®.
Si se queda embarazada mientras toma Tarceva®, informe a su médico inmediatamente.

Lactancia:
Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Tarceva®.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.

10/06/2016