

Temozolomida

¿Qué es y para qué se utiliza?

Temozolomida está indicado en el tratamiento de:

- Pacientes adultos con **glioblastoma** multiforme de nuevo diagnóstico concomitante con radioterapia y posteriormente como tratamiento en monoterapia.
- Niños a partir de tres años de edad, adolescentes y pacientes adultos con glioma maligno, tal como glioblastoma multiforme o astrocitoma anaplásico, que presentan recurrencia o progresión después de terapia estándar.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Temozolomida 20mg cápsulas duras.
Temozolomida 140mg cápsulas duras.
Temozolomida 180mg cápsulas duras.
Temozolomida 250mg cápsulas duras.
Las cápsulas duras tienen un cuerpo blanco opaco y tapa.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico.



Se administra vía oral cada 24 horas en los **días del 1 al 5 de cada ciclo repetido cada 28 días**. Las cápsulas no deben abrirse, romperse ni masticarse. Deben tomarse enteras, preferiblemente con agua, **SIN alimentos**. Se recomienda tomar siempre a las mismas horas del día.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
X	X	X	X	X																							

DESCANSO

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso que olvide una dosis, tómela lo antes posible si es el mismo día. Si ha transcurrido un día entero consulte a su médico.

No tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Temozolomida se encuentran: anorexia, cefalea, convulsiones, estreñimiento, náuseas, vómitos, sarpullido, alopecia y fatiga.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Temozolomida cuando se administran conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. De igual modo, Temozolomida puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Excipientes de declaración obligatoria


Contiene lactosa.

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

No conduzca sin consultar con su médico y/o farmacéutico.

Lea la sección "Conducción y uso de máquinas" en el prospecto del medicamento y consúltele cualquier duda.



Embarazo:

Está contraindicada la administración de Temozolomida en pacientes embarazadas. En pacientes en edad fértil se debe aconsejar sobre métodos anticonceptivos seguros.

Lactancia:

Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Temozolomida.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**