

Tyverb® (Lapatinib)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Tyverb® está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Tyverb® 250mg comprimidos recubiertos. Comprimidos recubiertos con película con forma ovalada, biconvexos, amarillos, con "GS XJG" grabado en una cara.

¿Cómo se debe conservar?

No conservar a temperatura superior a 30°C.

¿Cómo se administra? DUDAA

Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

Posología de la combinación Tyverb® / capecitabina

La dosis recomendada de **Tyverb® es de 1.250 mg (es decir, 5 comprimidos)** una vez al día de manera continuada.

La dosis recomendada de capecitabina es de 2.000 mg/m²/día, tomada en 2 dosis separadas cada 12 horas, en los días 1-14, en ciclos de 21 días. **Capecitabina** debe tomarse con alimentos o dentro de los 30 minutos siguientes a una comida.

Posología de la combinación Tyverb® / trastuzumab

La dosis recomendada **de Tyverb® es de 1.000 mg (es decir, 4 comprimidos)** una vez al día de manera continuada.

La dosis de inicio recomendada de trastuzumab es de 4 mg/Kg administrados mediante una perfusión por vía intravenosa (IV), seguido de 2 mg/Kg IV semanalmente.

Posología de la combinación Tyverb® / inhibidor de aromatasa

La dosis recomendada **de Tyverb® es 1.500 mg (es decir, 6 comprimidos)** una vez al día de manera continuada.

La dosis diaria de Tyverb® no se debe dividir. Tyverb® se debe tomar por lo menos una hora antes, o una hora después de las comidas, **con el estómago vacío.**



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Las dosis olvidadas no se deben reemplazar y se debe reanudar el tratamiento con la siguiente dosis diaria programada.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las reacciones adversas más frecuentes durante el tratamiento con lapatinib son acontecimientos gastrointestinales (como diarrea, náuseas y vómitos) y erupción.



Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Tyverb® cuando se administran conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. De igual modo, Tyverb® puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos. Se debe evitar la administración concomitante de Tyverb® con: ritonavir, saquinavir, telitromicina, ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, nefazodona, rifampicina, rifabutina, carbamazepina, fenitoína o *Hypericum perforatum* (hierba de San Juan). Se debe evitar el tratamiento simultáneo con sustancias que aumentan el pH gástrico, debido a que puede disminuir la solubilidad y absorción de lapatinib (omeprazol, antiácidos).

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección "Conducción y uso de máquinas"



Embarazo:

Se debe aconsejar a las mujeres en edad fértil que utilicen métodos anticonceptivos efectivos y que eviten quedarse embarazadas durante el tratamiento con Tyverb®. No se debe utilizar Tyverb® durante el embarazo a menos que sea claramente necesario.

Lactancia:

Se debe interrumpir la lactancia en mujeres en tratamiento con Tyverb®.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**