

## Xtandi® (Enzalutamida)



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Xtandi® está indicado para el tratamiento de hombres adultos con **cáncer de próstata** metastásico resistente a la castración.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Xtandi® 40mg cápsulas blandas.

Cápsulas blandas oblongas, de color blanco a blanquecino, con “ENZ” impreso en tinta negra en una cara.

### ¿Cómo se debe conservar?

No requiere condiciones especiales de conservación.

### ¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

La dosis recomendada es de 160 mg de enzalutamida (cuatro cápsulas de 40 mg) en una sola dosis diaria oral.



### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar Xtandi a la hora habitual, la dosis prescrita se debe tomar lo más cerca posible a la hora habitual. Si un paciente olvida la dosis durante un día entero, el tratamiento se debe reanudar al día siguiente con la dosis diaria habitual. .

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Xtandi se encuentran: astenia/fatiga,cefalea, sofocos e hipertensión.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

### Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Xtandi® cuando se administran conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. De igual modo, Xtandi® puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

### Excipientes de declaración obligatoria

Xtandi contiene sorbitol (E420). Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa no deben tomar este medicamento.

### **Advertencias**

#### **Embarazo y Lactancia**

Enzalutamida no está indicado en mujeres. Enzalutamida está contraindicado en mujeres embarazadas o que puedan quedarse embarazadas.

#### **Anticoncepción**

Si el paciente mantiene relaciones sexuales con una mujer embarazada o en edad fértil, debe utilizar un preservativo durante el tratamiento con enzalutamida y en los 3 meses posteriores al mismo.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**