

## Aranesp® (Darbepoetina)

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

La darbepoetina alfa es un antianémico. Su función es estimular la formación de eritrocitos (células de la sangre) a partir de los precursores de células progenitoras. La administración de darbepoetina produce un aumento del número de eritrocitos y de los valores de hemoglobina.

### Nombres y presentaciones comerciales

Aranesp 10 microgramos solución inyectable en jeringa precargada  
Aranesp 20 microgramos solución inyectable en jeringa precargada  
Aranesp 30 microgramos solución inyectable en jeringa precargada  
Aranesp 40 microgramos solución inyectable en jeringa precargada  
Aranesp 50 microgramos solución inyectable en jeringa precargada  
Aranesp 60 microgramos solución inyectable en jeringa precargada  
Aranesp 80 microgramos solución inyectable en jeringa precargada  
Aranesp 100 microgramos solución inyectable en jeringa precargada  
Aranesp 130 microgramos solución inyectable en jeringa precargada  
Aranesp 150 microgramos solución inyectable en jeringa precargada  
Aranesp 300 microgramos solución inyectable en jeringa precargada  
Aranesp 500 microgramos solución inyectable en jeringa precargada  
Aranesp 300 microgramos solución inyectable en pluma precargada  
Aranesp 500 microgramos solución inyectable en pluma precargada

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar en nevera a una temperatura entre 2-8° C. No congelar.  
Almacenar en el envase original protegido de la luz.

En el uso ambulatorio, el paciente puede sacar el medicamento de la nevera y mantenerlo a temperatura ambiente (no superior a 25° C) durante un periodo único máximo de hasta 7 días.

No lo utilice después de la fecha de caducidad que aparece en el cartón y en la etiqueta de la jeringa o pluma precargada después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.


### ¿Cómo se administra?

La darbepoetina en jeringa puede administrarse por vía intravenosa o subcutánea, mientras que la presentación en pluma solo puede administrarse vía subcutánea.

Saque la jeringa o pluma de la nevera 10-15 minutos antes de su administración. Compruebe que la solución sea transparente, incolora y sin partículas visibles. Este medicamento es para un único uso. No agitar.

#### Administración en jeringa

1. Lávese las manos y desinfecte la piel con un algodón o gasa con alcohol.
2. La tapa protectora se retira de la aguja de la jeringa y se expulsa el aire de la jeringa y de la aguja manteniendo la jeringa vertical y apretando el émbolo hacia arriba con cuidado.
3. Forme un pliegue cutáneo entre el índice y el pulgar e inserte la aguja en un ángulo de 45°- 90°.



4. Tire del émbolo hacia atrás y empuje lenta y regularmente el émbolo hasta que la jeringa esté vacía.
5. Retire la aguja de la piel, ponga algodón sobre el área y presione durante 10 segundos, pero no lo frote.

#### **Administración en pluma**

1. Lávese las manos y desinfecte la piel con un algodón o gasa con alcohol.
2. Quite el tapón gris.
3. Forme un ángulo de 90 grados con la piel y sujete la pluma firmemente contra la superficie de la piel para desbloquear el protector de seguridad.
4. Presione el botón de carga de la pluma con el dedo pulgar suavemente y suéltelo sin levantar la pluma durante todo el proceso. Oirá el primer Click.
5. Cuente 15 segundos y la inyección se habrá completado.
6. Una vez finalizada la inyección, levante la pluma de la piel. Es posible que oiga un segundo click cuando el botón rojo vuelva a su posición inicial.

**Para mayor información recomendamos ver el video demostrativo de la administración.**

#### ***¿Qué hacer si se olvida una dosis?***

Si se ha olvidado de administrar la inyección, hágalo lo antes posible. Si han pasado más de 24 horas comuníquelo a su médico o farmacéutico.

#### ***¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?***

Las reacciones adversas más frecuentes son dolor en el lugar de la inyección, hipertensión, problemas de circulación, reacciones alérgicas y erupción o enrojecimiento.

#### ***Uso de otros medicamentos***

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando algún medicamento y pregunte antes de tomar cualquier medicamento.

#### ***Advertencias***

- La darbepoetina debe, en general, utilizarse durante los periodos de embarazo y de lactancia sólo si los posibles beneficios superan los riesgos posibles para el feto. Consulte a su médico o farmacéutico.
- Dígale a su médico si tiene problemas de hemorragias, hipertensión, enfermedades del corazón o epilepsia.



**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, DEVUELVALOS  
POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**