

Exjade® (Desferasirox)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Exjade® está indicado en el tratamiento de pacientes con exceso de hierro en el organismo. Desferasirox facilita su eliminación.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Exjade® 90 mg comprimidos recubiertos con película
Comprimidos recubiertos con película de color azul claro, ovalados, biconvexos, con bordes biselados e impresiones (NVR en una cara y 90 en la otra)

Exjade® 360 mg comprimidos recubiertos con película
Comprimidos recubiertos con película de color azul oscuro, ovalados, biconvexos, con bordes biselados e impresiones (NVR en una cara y 360 en la otra)

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).



¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

Se administra vía oral cada 24 horas durante el periodo indicado por su médico.

Los comprimidos recubiertos con película se deben tragar enteros con un poco de agua. Los pacientes con dificultad para tragar comprimidos pueden aplastar los comprimidos recubiertos con película y tomar se el polvo junto con un alimento blando, como yogur o puré de manzana. Se debe consumir inmediatamente toda la dosis, sin guardar nada para más tarde.

Los comprimidos recubiertos con película se deben tomar una vez al día con el estómago vacío o con un alimento ligero, preferentemente a la misma hora cada día

¡ATENCIÓN! La dosis de los comprimidos recubiertos con película es más baja que la dosis de los comprimidos dispersables.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?



Si ha olvidado tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde en el mismo día. Tome la siguiente dosis según la pauta normal. No tome una dosis doble al día siguiente para compensar la(s) dosis olvidada.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Exjade® se encuentran: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, hinchazón, estreñimiento, mala digestión, úlceras y hemorragias digestivas, erupción en la piel, cambio en el color de la piel, dolor de cabeza, mareo, fiebre, dolor de garganta, hinchazón en brazos y piernas, ansiedad, alteración del sueño, cansancio y disminución de audición o visión.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Los antiácidos que contengan aluminio deben tomarse en otro momento del día.

Advertencias



Está contraindicada la administración de Exjade® en pacientes embarazadas. En pacientes en edad fértil se debe asegurar el cumplimiento de las condiciones del Programa de Prevención del Embarazo.

También debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Exjade®.

Tenga especial cuidado si tiene problemas de hígado o corazón, consulte con su médico antes de iniciar el tratamiento.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**