

Revolade® (Eltrombopag)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Revolade® es el medicamento comercializado de eltrombopag, actúa iniciando el proceso de formación de plaquetas. Se utiliza para la trombocitopenia (pocas plaquetas en sangre) de origen inmune y asociada a Hepatitis C crónica, también en aplasia severa (pocas células sanguíneas).

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Revolade® 25 mg comprimidos recubiertos

Comprimido recubierto con película de color blanco, redondo, biconvexo, grabado con 'GS NX3' y '25' en una cara.

Revolade® 50 mg comprimidos recubiertos.

Comprimido recubierto con película, de color marrón, redondo, biconvexo, grabado con 'GS UFU' y '50' en una cara.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).



¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis debe individualizarse en base al recuento de plaquetas del paciente. Revolade® se debe tomar sin alimentos, y con especial atención de los siguientes productos: antiácidos, productos lácteos (u otros alimentos que contengan calcio), o suplementos minerales que se deben tomar al menos dos horas antes o cuatro horas después.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?



En caso que olvide una dosis, si han pasado menos de 12 horas, tómela tan pronto como sea posible. Continúe con la siguiente dosis manteniendo el horario habitual.

Si han pasado más de 12 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar con el tratamiento.

No tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Revolade® se encuentran: daño hepático, problemas de circulación, dolor de cabeza, anemia, disminución del apetito, insomnio, tos, náuseas, diarrea, alopecia, picor, dolor muscular, fiebre, fatiga, síndrome gripal, escalofríos y hinchazón de pies.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Los antiácidos que contengan aluminio deben tomarse en otro momento del día.



Advertencias

Está contraindicada la administración de Revolade® en pacientes embarazadas. En pacientes en edad fértil se debe asegurar el cumplimiento de las condiciones del Programa de Prevención del Embarazo.

También debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Revolade®

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**