

## **Eprex®** **(Epoetina alfa)**

### **¿Qué es y para qué se utiliza?**

La epoetina alfa es un antianémico. Su función es estimular la formación de eritrocitos (células de la sangre) a partir de los precursores de células progenitoras. La administración de epoetina produce un aumento del número de eritrocitos y de los valores de hemoglobina.


### **Nombres y presentaciones comerciales**

EPREX 1.000 UI/0,5 ml solución inyectable en jeringa precargada  
EPREX 8.000 UI/0,8 ml solución inyectable en jeringa precargada  
EPREX 20.000 UI/0,5 ml solución inyectable en jeringa precargada  
EPREX 40.000 UI/1 ml solución inyectable en jeringa precargada

### **¿Cómo se debe conservar?**

Conservar en nevera a una temperatura entre 2-8° C. No congelar ni agitar.  
Almacenar en el envase original protegido de la luz.

En el uso ambulatorio, el paciente puede sacar el medicamento de la nevera y mantenerlo a temperatura ambiente (no superior a 25° C) durante un periodo único máximo de hasta 3 días. No lo utilice después de la fecha de caducidad que aparece en el cartón y en la etiqueta de la jeringa precargada después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.



### **¿Cómo se administra?**

La epoetina debe administrarse por vía intravenosa o subcutánea.

1. Saque la jeringa de la nevera 10-15 minutos antes de su administración. Compruebe que la solución sea transparente, incolora y sin partículas visibles. Este medicamento es para un único uso. No agitar.
2. La tapa protectora se retira de la aguja de la jeringa y se expulsa el aire de la jeringa y de la aguja manteniendo la jeringa vertical y apretando el émbolo hacia arriba con cuidado.
3. Lávese las manos y desinfecte la piel con un algodón o gasa con alcohol.
4. Forme un pliegue cutáneo entre el índice y el pulgar e inserte la aguja en un ángulo de 45°- 90°.
5. Tire del émbolo hacia atrás y empuje lenta y regularmente el émbolo hasta que la jeringa esté vacía.
6. Retire la aguja de la piel, ponga algodón sobre el área y presione durante 10 segundos, pero no lo frote.

**Para mayor información recomendamos ver el video demostrativo de la administración.**

### **¿Qué hacer si se olvida una dosis?**

Si se ha olvidado de administrar la inyección, hágalo lo antes posible. Si han pasado más de 24 horas comuníquelo a su médico o farmacéutico.

***¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?***

Las reacciones adversas más frecuentes son diarrea, náuseas, vómitos, fiebre, síndrome pseudogripal, problemas de circulación, hipertensión, dolor de cabeza, tos y enrojecimiento de la piel.

***Uso de otros medicamentos***

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando algún medicamento y pregunte antes de tomar cualquier medicamento.

***Advertencias***

La eritropoyetina debe, en general, utilizarse durante los periodos de embarazo y de lactancia sólo si los posibles beneficios superan los riesgos posibles para el feto.



**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, DEVUELVALOS POR  
FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**