

## Zarzio® (Filgrastim)



### **¿Qué es y para qué se utiliza?**

Es un factor humano de estimulación de colonias de granulocitos, los productores de neutrófilos (glóbulos blancos). Una reducción del número de glóbulos blancos (neutropenia) puede producirse por motivos diversos y hace que su cuerpo tenga menos posibilidades de luchar contra las infecciones. Filgrastim estimula la médula ósea para producir rápidamente nuevos glóbulos blancos.

### **Nombres y presentaciones comerciales**

Zarzio 30 MU/0,5 ml solución inyectable o para perfusión en jeringa precargada  
Zarzio 48 MU/0,5 ml solución inyectable o para perfusión en jeringa precargada

### **¿Cómo se debe conservar?**

Mantener el envase en el embalaje exterior, para preservarlo de la luz

Conservar en nevera (2°C y 8°C). (NUNCA en el congelador)

Si las jeringas no pueden conservarse en nevera, a temperatura ambiente (hasta 25°C) tienen una validez de tres días. Después de este periodo, el producto no debe volver a refrigerarse y debe desecharse.

### **¿Cómo se administra?**

Utilice filgrastim de la forma prescrita por su médico. La dosis habitual es de 0,5 MU (5 mcg/kg/día) inyectada por vía subcutánea (bajo la piel). La primera dosis normalmente se administrará un día después de terminar la quimioterapia. Procure administrarla todos los días a la misma hora.

Antes de inyectarse la dosis saque la jeringa de nevera y espere unos minutos hasta que se quede a temperatura ambiente (20-30 minutos).

- Lávese las manos. Extraiga una jeringa del paquete y retire la tapa protectora de la aguja para inyección. Las jeringas tienen grabados anillos de graduación para permitir su uso parcial si es necesario.
- Limpie la piel en el lugar de la inyección con una compresa con alcohol.
- Forme un pliegue de la piel pellizcándola entre el pulgar y el índice.
- Inserte la aguja en el pliegue de la piel con un movimiento rápido y firme e inyecte la Solución.
- Manteniendo la piel pellizcada, presione el émbolo lenta y uniformemente.
- Una vez inyectado el líquido, retire la aguja y suelte la piel..
- Introduzca la jeringa usada en el recipiente especial de desecho. Use cada jeringa sólo para una inyección.



**Para mayor información recomendamos ver el video demostrativo de la administración.**

***¿Qué hacer si se olvida una dosis?***

Póngasela tan pronto como se acuerde y a partir de este momento espere 24 horas para la siguiente dosis. Nunca se debe administrar una dosis doble para compensar un olvido. Las jeringas son de un solo uso.

***¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?***

Las reacciones adversas más frecuentemente relacionadas con filgrastim fueron el dolor óseo, dolor muscular y óseo general y aumento del tamaño del bazo.

Si presenta cualquiera de los siguientes síntomas poco después de haberse inyectado Filgrastim **INTERRUMPA** el tratamiento y comuníquelo inmediatamente a su médico: "Pitos" repentinos y dolor/opresión en el pecho, hinchazón de párpados, cara o labios, erupción cutánea en cualquier parte del cuerpo.

***Uso de otros medicamentos***

No tome por su cuenta ningún medicamento. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.



***Advertencias***

No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de filgrastim en mujeres embarazadas y con lactancia materna.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, DEVUELVALOS POR  
FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**