

## Jakavi® (Ruxolitinib)

### **¿Qué es y para qué se utiliza?**

Jakavi® está indicado en el tratamiento de pacientes con mielofibrosis y policitemia vera (exceso del número de células de la sangre) en el organismo. Ruxolitinib disminuye la formación de células sanguíneas.

### **Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital**

Jakavi® 10 mg comprimidos.

Jakavi® 15 mg comprimidos.

Jakavi® 20 mg comprimidos.

Comprimidos redondos curvados de color blanco a blanquecino con la inscripción «NVR» grabada en una cara y «L10», «L15» o «L20» en la otra.

### **¿Cómo se debe conservar?**

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

### **¿Cómo se administra?**

Jakavi® se administra por vía oral, con o sin comida.

La dosis inicial es 10 mg en Policitemia vera dos veces al día o 15 mg en Mielofibrosis dos veces al día, y se modificará la dosis para aumentar los efectos o reducir los efectos secundarios.

### **¿Qué hacer si se olvida una dosis?**



En caso que olvide una dosis, NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar con el tratamiento.

No tome una dosis doble para compensar un olvido.

### **¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?**

Los efectos adversos más frecuentes son: disminución de número de plaquetas, anemia, hematomas, dolor de cabeza, mareo, estreñimiento, herpes, aumento de peso, elevación de las transaminasas y aumento del colesterol.

### **Uso de otros medicamentos**

Algunos medicamentos pueden disminuir el efecto de Ruxolitinib tales como, entre otros: carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, rifampicina, Hierba de San. Mientras que otros medicamentos pueden aumentar la aparición de efectos adversos: claritromicina, itraconazol, ketoconazol, lopinavir/ritonavir, voriconazol.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

### **Excipientes de declaración obligatoria**

Contiene lactosa.

## **Advertencias**

### **Conducción y uso de máquinas**

No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección "Conducción y uso de máquinas"



### **Embarazo**

Está contraindicada la administración de Jakavi® en pacientes embarazadas. En pacientes en edad fértil se debe asegurar el cumplimiento de las condiciones del Programa de Prevención del Embarazo.

### **Lactancia**

También debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Jakavi®.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**