



Nivestim® (Filgrastim)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Filgrastim es un factor humano de estimulación de colonias de granulocitos, los productores de neutrófilos (glóbulos blancos). Una reducción del número de glóbulos blancos (neutropenia) puede producirse por motivos diversos y hace que su cuerpo tenga menos posibilidades de luchar contra las infecciones. Filgrastim estimula la médula ósea para producir rápidamente nuevos glóbulos blancos.

Nombres y presentaciones comerciales

Nivestim 12 MU/0,2 ml solución inyectable y para perfusión
Nivestim 30 MU/0,5 ml solución inyectable y para perfusión
Nivestim 48 MU/0,5 ml solución inyectable y para perfusión

¿Cómo se debe conservar?

Mantener el envase en el embalaje exterior, para preservarlo de la luz
Conservar en nevera (2°C y 8°C).

Si las jeringas no pueden conservarse en nevera, a temperatura ambiente (hasta 25°C) tienen una validez de siete días.




¿Cómo se administra?

Utilice filgrastim de la forma prescrita por su médico. La dosis habitual es de 0,5 MU (5 mcg/kg/día) inyectada por vía subcutánea (bajo la piel). La primera dosis normalmente se administrará un día después de terminar la quimioterapia. Procure administrarla todos los días a la misma hora.

Antes de inyectarse la dosis saque la jeringa de nevera y espere unos minutos hasta que se quede a temperatura ambiente (20-30 minutos).

- Lávese las manos. Extraiga una jeringa del paquete y retire la tapa protectora de la aguja para inyección. Las jeringas tienen grabados anillos de graduación para permitir su uso parcial si es necesario.
- Limpie la piel en el lugar de la inyección con una compresa con alcohol.
- Forme un pliegue de la piel pellizcándola entre el pulgar y el índice.
- Inserte la aguja en el pliegue de la piel con un movimiento rápido y firme e inyecte la
- Solución.
- Manteniendo la piel pellizcada, presione el émbolo lenta y uniformemente.
- Una vez inyectado el líquido, retire la aguja y suelte la piel.
- Introduzca la jeringa usada en el recipiente especial de desecho. Use cada jeringa sólo para una inyección.

Para mayor información recomendamos ver el video demostrativo de la administración.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Póngasela tan pronto como se acuerde y a partir de este momento espere 24 horas para la siguiente dosis. Nunca se debe administrar una dosis doble para compensar un olvido. Las jeringas son de un solo uso.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las reacciones adversas más frecuentemente relacionadas con filgrastim fueron el dolor óseo, dolor muscular y óseo general y aumento del tamaño del bazo.

Si presenta cualquiera de los siguientes síntomas poco después de haberse inyectado Filgrastim **INTERRUMPA** el tratamiento y comuníquelo inmediatamente a su médico: "Pitos" repentinos y dolor/opresión en el pecho, hinchazón de párpados, cara o labios, erupción cutánea en cualquier parte del cuerpo.

Uso de otros medicamentos

No tome por su cuenta ningún medicamento. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Advertencias

No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de filgrastim en mujeres embarazadas y con lactancia materna.



**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS, DEVUELVALOS POR
FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**