

Xagrid® (Anagrelida)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Xagrid® está indicado en el tratamiento de pacientes con exceso de plaquetas (trombocitemia) en el organismo. Anagrelida disminuye la formación de plaquetas.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Xagrid® 0,5 mg cápsulas duras.

Cápsulas duras opacas de color blanco con la inscripción 'S063' impresa.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

¿Cómo se administra?

La dosis habitual de inicio es una cápsula de 0,5mg dos veces al día.

Posteriormente se ajustará la dosis hasta obtener los valores de plaquetas adecuados.

Los alimentos no alteran la absorción, por lo que puede tomarse con o sin alimentos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?



En caso que olvide una dosis, si han pasado menos de 12 horas, tómela tan pronto como sea posible. Continúe con la siguiente dosis manteniendo el horario habitual.

Si han pasado más de 12 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar con el tratamiento.

No tome una dosis doble para compensar un olvido.



¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Xagrid® se encuentran:

Dolor de cabeza, palpitaciones, retención de líquidos, náuseas y diarrea.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Excipientes de declaración obligatoria

Contiene lactosa.

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección "Conducción y uso de máquinas"



Embarazo

Está contraindicada la administración de Xagrid® en pacientes embarazadas. En pacientes en edad fértil se debe asegurar el cumplimiento de las condiciones del Programa de Prevención del Embarazo.

Lactancia

También debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Xagrid®.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**