

## Ofev<sup>®</sup> (Nintedanib)

### **¿Qué es y para qué se utiliza?**

Ofev<sup>®</sup> está indicado en adultos en el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática de leve a moderada.

### **Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital**

Ofev 100 mg cápsulas blandas.

Cápsulas de gelatina blanda, opacas y de color melocotón, grabadas en un lado en color negro con el logotipo de la empresa Boehringer Ingelheim y "100".

Ofev 150 mg cápsulas blandas.

Cápsulas de gelatina blanda oblongas, opacas y de color marrón, grabadas en un lado en color negro con el logotipo de la empresa Boehringer Ingelheim y "150".

### **¿Cómo se debe conservar?**

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 25°C).

### **¿Cómo se administra?**

Ofev se administra por vía oral. La dosis recomendada es de 150 mg de nintedanib dos veces al día, administrado aproximadamente con 12 horas de diferencia. La dosis diaria de 100 mg dos veces al día solo se recomienda en pacientes que no toleran la dosis diaria de 150 mg dos veces al día.

Las cápsulas se deben tomar con alimentos, y tragarse enteras con agua, sin masticarlas ni partirlas.



### **¿Qué hacer si se olvida una dosis?**



Si se olvida una dosis, la administración se debe reanudar a la dosis recomendada a la siguiente hora del programa establecido. Si se olvida una dosis, el paciente no debe tomar una dosis adicional. No se debe superar la dosis diaria máxima recomendada de 300 mg.

### **¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?**

Los efectos adversos más frecuentes del tratamiento con nintedanib son diarrea, náuseas, dolor abdominal, aumento de las enzimas hepáticas.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

### **Uso de otros medicamentos**

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Ofev<sup>®</sup> cuando se administran conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

**Advertencias**



**Embarazo:**

Como nintedanib puede causar daño fetal también en humanos, no se debe utilizar durante el embarazo.

**Lactancia:**

Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Ofev.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**