

Alkeran® (Melfalan)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Alkeran® es el nombre comercial del medicamento melfalán. Está indicado en el tratamiento del mieloma múltiple y del carcinoma de ovario avanzado.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Alkeran® son comprimidos de 2 mg, de color blanco.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar refrigerado, a una temperatura de 2 – 8°C. No congelar.

Manténgalo en su envase original bien cerrado.

Excepcionalmente, puede mantenerse hasta un máximo de 7 días a temperatura ambiente (que no supere los 30°C).

¡Confirme que el medicamento que se va a tomar es el que indica su receta: Alkeran! Existe otro medicamento comercializado con gran similitud en el embalaje.

¿Cómo se administra?

Debe tomar los comprimidos según la dosis prescrita por su médico en una única toma.

Debe tomar los comprimidos **sin alimentos**, es decir, una hora antes o dos horas después de comer. Tomar siempre a la misma hora.

Los comprimidos se deben tragar **enteros** con un vaso de agua, y no deben masticarse, machacarse ni disolverse.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?



Si se olvida de tomar una dosis de Melfalán, tómela lo antes posible. Si han pasado más de 12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.

Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de una hora desde la toma.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son: dolores musculares y en las articulaciones, inflamación de piernas y pies, caída leve del cabello, náuseas, vómitos y llagas en la boca, mayor susceptibilidad a tener infecciones, picor y erupciones en la piel, puede aumentar el riesgo de hemorragias.

Uso de otros medicamentos

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma: ácido acetilsalicílico (Aspirina®), acenocumarol (Sintrom®), warfarina, ciclosporina, digoxina.

Advertencias



Embarazo:

La utilización de melfalan debe evitarse siempre que sea posible durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre.

Lactancia:

Las madres tratadas con melfalan no deben alimentar a sus hijos con leche materna.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**