

Imbruvica® (Ibrutinib)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Imbruvica® está indicado en el tratamiento de distintas enfermedades hematológicas: linfoma de células del manto en recaída o refractario, leucemia linfática crónica y macroglobulinemia de Waldenström. Ibrutinib disminuye el crecimiento del tumor.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Imbruvica® 140mg capsulas.

Cápsula dura de color blanco opaco, marcada con “ibr 140mg” en tinta negra.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis es 3 ó 4 cápsulas al día, tomadas en una única toma.

Imbruvica® se debe administrar por vía oral una vez al día con un vaso de agua, proximadamente a la misma hora cada día.

Las cápsulas se deben tragar **enteras** con agua y no se deben abrir, romper ni masticar. No se debe tomar con zumo de pomelo o naranjas amargas

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se olvida una dosis, puede tomarla lo antes posible ese mismo día y volver al horario normal al día siguiente.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Imbruvica® se encuentran: infecciones, anemia, mareo, cefalea, sangrado, diarrea, vómitos, náuseas, estreñimiento, enrojecimiento de la piel, dolor muscular y óseo.



Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Imbruvica® cuando se administran conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Los siguientes medicamentos están contraindicados con el uso de ibrutinib: claritromicina, cobicistat, ketoconazol, voriconazol, eritromicina, hierba de San Juan; entre otros.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección "Conducción y uso de máquinas"



Embarazo:

Está contraindicada la administración de Imbruvica® en pacientes embarazadas.

Las mujeres en edad fértil deben asegurarse de utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y hasta 3 meses tras finalizar el tratamiento.

Lactancia:

Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Imbruvica®

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**