Imnovid® (Pomalidomida)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Imnovid® contiene el medicamento pomalidomida. En combinación con dexametasona está indicado en el tratamiento de los pacientes adultos con mieloma múltiple resistente.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Imnovid® 3 mg cápsula dura: tapa opaca de color azul oscuro y cuerpo opaco de color verde marcadas con "POML 3 mg" en tinta blanca.
Imnovid® 4 mg cápsula dura: tapa opaca de color azul oscuro y cuerpo opaco de color azul marcadas con "POML 4 mg" en tinta blanca.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30ºC).

¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

La dosis inicial recomendada es de 4 mg de Imnovid® una vez al día por vía oral, en los días del 1 al 21 de ciclos repetidos de 28 días. La dosis recomendada de dexametasona es de 40 mg por vía oral una vez al día, en los días 1, 8, 15 y 22 de cada ciclo de tratamiento de 28 días.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	DESCANSO						

Imnovid debe tomarse a la misma hora cada día. Las cápsulas no deben abrirse, romperse ni masticarse. Este medicamento debe tomarse **entero**, preferiblemente con agua, con o sin alimentos.
Se recomienda presionar solo en un extremo de la cápsula para sacarla del blíster y reducir así el riesgo de deformación o rotura de la cápsula.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si el paciente olvida tomar una dosis de Imnovid® un día, el paciente debe entonces tomar la próxima dosis al día siguiente a la hora habitual. Los pacientes no deben ajustar la dosis para compensar una dosis olvidada en días anteriores.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre las reacciones adversas al tratamiento más frecuentes, cabe destacar: infecciones respiratorias, reactivación de virus herpes zóster y de hepatitis B, transtornos de la sangre (anemia, leucopenia, neutropenia), disminución del apetito, hiperpotasemia, hiponatremia, hiperuricemia, estado de confusión, hormigueo en dedos, mareo, temblor, urticaria, insuficiencia cardiaca, dolor óseo, edemas, dairrea, náuseas o estreñimiento.

Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Imbruvica® cuando se administran conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

No conduzca sin consultar con su médico y/o farmacéutico.
Lea la sección “Conducción y uso de máquinas” en el prospecto del medicamento y consúlteles cualquier duda.

Embarazo

Pomalidomida no debe tomarse durante el embarazo ya que es esperable un efecto teratogénico.

Lactancia:

Debido a las posibles reacciones adversas en lactantes asociadas a pomalidomida, se debe decidir si es necesario suspender la lactancia o suspender el tratamiento tras considerar la importancia del tratamiento para la madre.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUÉLVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.