

## Sprycel® (Dasatinib)

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Sprycel® está indicado en el tratamiento de distintas enfermedades hematológicas: leucemia mieloide crónica y leucemia linfoblástica aguda.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Sprycel® 50 mg comprimidos recubiertos con película.

Comprimido recubierto con película oval, de color blanco a blanquecino, biconvexo, con “BMS” grabado en una cara y “528” en la otra.

Sprycel® 70 mg comprimidos recubiertos con película.

Comprimido recubierto con película oval, de color blanco a blanquecino, biconvexo, con “BMS” grabado en una cara y “524” en la otra.

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

### ¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis inicial habitual es 100mg una vez al día, pero se modificará en función del efecto y la toxicidad que le produzca.

SPRYCEL debe ser administrado por vía oral. Los comprimidos recubiertos con película no deben aplastarse ni fraccionarse, deben tragarse enteros. Los comprimidos pueden tomarse con o sin comida y deben tomarse sistemáticamente o por la mañana o por la noche. Los antiácidos deben administrarse hasta 2 horas antes o 2 horas después de SPRYCEL.



### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?



No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Tome la siguiente dosis prevista en el momento habitual.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Sprycel® se encuentran: infecciones, anemia, cefalea, sangrados, dificultad de respiración, diarrea, náuseas, vómitos, erupción en la piel, dolor muscular y óseo, hinchazón de pies y cara y fatiga.



Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

### Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Sprycel® cuando se administran conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. De igual modo, Sprycel® puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos (antibióticos por ejemplo).

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

### **Excipientes de declaración obligatoria**

Lactosa

### **Advertencias**

#### **Conducción y uso de máquinas**

No conduzca sin consultar con su médico y/o farmacéutico.

Lea la sección "Conducción y uso de máquinas" en el prospecto del medicamento y consúlteles cualquier duda.



#### **Embarazo:**

Está contraindicada la administración de Sprycel® en pacientes embarazadas.

Las mujeres en edad fértil deben asegurarse de utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento.

#### **Lactancia:**

Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Sprycel®

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**