

Talidomida

¿Qué es y para qué se utiliza?

Talidomida en combinación con melfalán y prednisona está indicado como tratamiento de primera línea de pacientes con mieloma múltiple no tratado de edad ≥ 65 años o no aptos para recibir quimioterapia a altas dosis.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Talidomida 50 mg cápsula dura.

Cápsulas blancas y opacas marcadas con “Thalidomide Celgene 50mg”

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis inicial habitual es 200mg una vez al día, pero se modificará en función del efecto y la toxicidad que le produzca. Se debe administrar un número máximo de 12 ciclos de 6 semanas (42 días). Debe tomarse en una sola dosis al acostarse para reducir así el impacto de la somnolencia.

Este medicamento puede tomarse con o sin alimentos.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?



No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si se olvida de tomar la dosis y han transcurrido menos de 12 horas: tome las cápsulas inmediatamente. Si han transcurrido más de 12 horas: tome las siguientes cápsulas a la hora habitual al día siguiente

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Talidomida se encuentran: infecciones, reacciones cutáneas, trastornos hepáticos, somnolencia y problemas cardiovasculares.



Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Talidomida puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos (sedantes, digoxina, warfarina).

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

No conduzca sin consultar con su médico y/o farmacéutico.

Lea la sección "Conducción y uso de máquinas" en el prospecto del medicamento y consúltele cualquier duda.



Embarazo:

Está totalmente contraindicada la administración de Talidomida en pacientes embarazadas. Provoca muy frecuentemente defectos congénitos graves y con peligro para la vida.

Las mujeres en edad fértil deben asegurarse de utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento.

Lactancia:

Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**