

## Zydelig® (Idelalisib)

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Zydelig® está indicado en el tratamiento de distintas enfermedades hematológicas: leucemia linfocítica crónica (en combinación con rituximab) y en linfoma folicular refractario. Idelalisib reduce el crecimiento de las células anormales en estas enfermedades.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Zydelig® 150 mg comprimidos recubiertos con película.

Comprimido recubierto con película de color rosa y forma ovalada y con "GSI" grabado por un lado y "150" por el otro.

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

### ¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

La dosis recomendada de Zydelig® es de 150 mg, administrados por vía oral dos veces al día. Se debe continuar el tratamiento hasta la progresión de la enfermedad o la aparición de efectos tóxicos inaceptables.

El comprimido recubierto con película se debe tragar el comprimido entero y no se debe masticar ni machacar. El comprimido recubierto con película se puede tomar acompañado o no de alimentos



### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?



Si un paciente omite una dosis de Zydelig® y han transcurrido un máximo de 6 horas con respecto a la hora a la que lo toma normalmente, debe tomar la dosis omitida lo antes posible y proseguir con su horario posológico habitual. Si un paciente omite una dosis y han transcurrido más de 6 horas, no debe tomar la dosis omitida, sino simplemente proseguir con su horario posológico habitual

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Zydelig® se encuentran: alteraciones analíticas (disminución de neutrófilos y aumento de las transaminasas hepáticas), diarrea, erupción en la piel y fiebre.



Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

### Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Zydelig® cuando se administran conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. De igual modo, Zydelig® puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos. No se debe tomar Zydelig conjuntamente con: alfuzosina, amiodarona,quetiapina,simvastatina y salmeterol.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

### **Advertencias**



#### **Embarazo:**

Está contraindicada la administración de Zydelig® en pacientes embarazadas.

Las mujeres en edad fértil deben asegurarse de utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y hasta 1 mes tras finalizar el tratamiento.

#### **Lactancia:**

Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Zydelig®

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**