

## **Reyataz<sup>®</sup>** **(Atazanavir)**

### **¿Qué es y para qué se utiliza?**

Reyataz<sup>®</sup> está indicado para el tratamiento de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH-1) en combinación con otros medicamentos antirretrovirales.

### **Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital**

REYATAZ 200 mg cápsulas duras

Cápsula opaca azul en la que se imprime con tinta blanca en una mitad "BMS 200 mg" y en la otra "3631".

REYATAZ 300 mg cápsulas duras

Cápsula opaca roja y azul en la que se imprime con tinta blanca en una mitad "BMS 300 mg" y en la otra "3622"

### **¿Cómo se debe conservar?**

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 25°C). No refrigerar ni congelar.

### **¿Cómo se administra?**

Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis recomendada para adultos de REYATAZ cápsulas es de 300 mg administrados junto con 100 mg de ritonavir una vez al día.

Debe tomarse CON alimentos. Debe tragarse entero, sin masticar ni chupar en la boca ni disolverlos. Se recomienda tomar siempre a las mismas horas del día.



### **¿Qué hacer si se olvida una dosis?**

Si ha olvidado una dosis, tómela lo antes posible con algún alimento y después tome la siguiente dosis programada a la hora habitual. Si ya es casi la hora de la siguiente dosis, no tome la dosis olvidada. Espere y tome la siguiente dosis a la hora habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

### **¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?**

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Reyataz<sup>®</sup> se encuentran: coloración amarillenta de la piel o de la parte blanca de los ojos causada por niveles altos de bilirrubina en sangre, erupción en la piel, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, dolor de estómago, náuseas, indigestión o cansancio extremo.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

### **Uso de otros medicamentos**

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Reyataz: antibióticos, antifúngicos o antimicrobianos (claritromicina, itraconazol, ketoconazol, voriconazol, rifampicina), quetiapina, antiácidos (separar dosis al menos 2 horas), alfuzosina, hierba de San Juan o hipérico.

Si está tomando algún medicamento indíquesele a su médico antes de iniciar el tratamiento con Reyataz.

### **Excipientes de declaración obligatoria**

Lactosa

## **Advertencias**

### **Embarazo**

Si está embarazada o cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento ya que podría necesitar un cambio en su tratamiento.

### **Lactancia**

Se ha detectado atazanavir en la leche materna. Como regla general, se recomienda que las mujeres con infección por VIH no den el pecho a sus hijos para evitar la transmisión del VIH.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**