

## **Evotaz<sup>®</sup>** **(Atazanavir/Cobicistat)**



### **¿Qué es y para qué se utiliza?**

Evotaz<sup>®</sup> puede ser utilizado por adultos de 18 años y mayores que estén infectados por el VIH. Normalmente se utiliza en combinación con otros medicamentos anti-VIH para ayudar a controlar su infección por VIH.

### **Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital**

Evotaz<sup>®</sup> comprimidos (300 mg de atazanavir y 150 mg de cobicistat).

Comprimido recubierto con película, rosa, ovalado, biconvexo, marcado con "3641" en una cara y liso en la otra.

### **¿Cómo se debe conservar?**

No conservar a temperatura superior a 30°C.

### **¿Cómo se administra?**

La dosis recomendada de Evotaz<sup>®</sup> en adultos es de un comprimido diario tomado con alimentos, en combinación con otros medicamentos anti-VIH.

Trague el comprimido entero; no machaque ni mastique los comprimidos.



### **¿Qué hacer si se olvida una dosis?**

Si olvida una dosis de EVOTAZ durante 12 horas o menos, tómela inmediatamente con alimentos y después tome la siguiente dosis programada a la hora habitual.

Si olvida una dosis y han pasado más de 12 horas del momento en el que debería haber tomado EVOTAZ, no tome la dosis olvidada. Espere y tome la siguiente dosis a la hora habitual.

No duplique la siguiente dosis.

### **¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?**

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Evotaz<sup>®</sup> se encuentran: náuseas e ictericia (cuando la piel y/o los ojos se ponen amarillos).

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico.

### **Uso de otros medicamentos**

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los medicamentos a base de plantas y los adquiridos sin receta.

Recuerde informar a su médico o farmacéutico si empieza a tomar un nuevo medicamento mientras está tomando Evotaz<sup>®</sup>.

Los siguientes medicamentos no se deben usar junto con Evotaz: rifampicina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, cisaprida, amiodarona, dronedarona, alfuzosina, quetiapina, medicamentos que contengan hierba de San Juan, midazolam oral, simvastatina y lovastatina, ticagrelor o sildenafil.

### **Advertencias**

Asegúrese de informar a su médico: si tiene problemas de hígado, diabetes o problemas con sus riñones.

Los pacientes tratados con EVOTAZ pueden desarrollar erupción cutánea grave. Informe a su médico inmediatamente si desarrolla una erupción.

**Embarazo:**

Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Su médico le informará sobre los posibles beneficios y riesgos de tomar EVOTAZ para usted y su niño.

**Lactancia:**

Como regla general, se recomienda que las mujeres que presentan infección por VIH no alimenten a sus hijos con leche materna bajo ningún concepto, para evitar la transmisión del VIH al bebé.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**