

## Rezolsta® (Darunavir/Cobicistat)



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Rezolsta® está indicado en combinación con otros medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 1 (VIH-1) en adultos de 18 o más años de edad.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Rezolsta® (800mg de darunavir y 150mg de cobicistat) comprimidos recubiertos.  
Comprimido recubierto con película, ovalado de color rosa de 23 mm x 11,5 mm, grabado con "800" en una cara y "TG" en la otra.

### ¿Cómo se debe conservar?

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

### ¿Cómo se administra?

El régimen posológico recomendado es de un comprimido recubierto con película de Rezolsta® una vez al día tomado con alimentos.  
Debe tomar Rezolsta® a diario y siempre con alimentos. Debe tomar una comida o tentempié en los 30 minutos previos a la toma de Rezolsta®. El tipo de alimento no es importante. Trague el comprimido entero con una bebida que puede ser agua o leche.



### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?



Si se da **cuenta en las 12 horas** siguientes, tome el comprimido inmediatamente. Tómelo siempre con alimento. Si se da **cuenta después de 12 horas**, omita esa toma y tome la siguiente dosis de la forma acostumbrada. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Pueden aparecer signos y síntomas de problemas en el hígado: pueden consistir en coloración amarillenta de la piel o el blanco de los ojos, coloración oscura de la orina (como té oscuro), coloración pálida de las heces (deposiciones), náuseas, vómitos, pérdida del apetito, o dolor, molestias, o sensibilidad a la palpación en el costado derecho debajo de las costillas.  
También puede aparecer erupción de la piel, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, pérdida de apetito, sueños anormales, vómitos, dolor o hinchazón de la barriga, indigestión, flatulencia, dolor muscular, calambres en el músculo y debilidad o cansancio.

### Uso de otros medicamentos

No combine Rezolsta® con ninguno de los medicamentos siguientes: alfuzosina, amiodarona, ranolazina, carbamacepina, fenobarbital, fenitoina, cohicina, rifampicina, quetiapina, cisaprida, Hierba de San Juan o hipérico, simvastatina, midazolam, sildenafilo, ticagrelor, entre otros.

Informe a su médico antes de iniciar cualquier tratamiento.

### **Excipientes de declaración obligatoria**

Celulosa

### **Advertencias**

#### **Embarazo**



Informe a su médico inmediatamente si está embarazada, tiene intención de quedarse embarazada. Las mujeres embarazadas o en período de lactancia no deben tomar Rezolsta® salvo que así se lo indique específicamente el médico. Solamente se debe utilizar REZOLSTA durante el embarazo si el posible beneficio justifica el potencial riesgo.

#### **Lactancia**

Se recomienda que las mujeres infectadas por el VIH no den el pecho a su hijo, tanto por la posibilidad de transmitirle la infección a través de la leche materna, como por los efectos desconocidos que puede tener en él este medicamento.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**