

Intelence® (Etravirina)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Intelence® se utiliza combinado con otros medicamentos contra el VIH para tratar a adultos y niños de 6 años de edad y mayores infectados por el VIH y que ya han utilizado otros medicamentos contra el VIH.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Intelence® 200mg comprimidos.

Comprimido ranurado de color blanco a blanquecino, ovalado, marcado con "TMC" en un lado.

¿Cómo se debe conservar?

Los comprimidos de INTELENCE deben conservarse en el frasco original. Mantener el frasco perfectamente cerrado para protegerlo de la humedad. El frasco contiene 2 bolsitas (desecantes) para mantener secos los comprimidos. Estas bolsas deben mantenerse siempre en el frasco y no deben ingerirse.

¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis recomendada de INTELENCE es de un comprimido dos veces al día. Tome INTELENCE por la mañana y otro por la noche. Es importante que tome INTELENCE después de las comidas



Trague el/los comprimido/s de INTELENCE enteros con un vaso de agua. No mastique el/los comprimido/s.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se da cuenta en las 6 horas siguientes a la hora habitual de la toma de INTELENCE, tome los comprimidos tan pronto como sea posible. Tome los comprimidos siempre después de una comida. Luego tome la siguiente dosis como lo hace habitualmente.

Si se da cuenta después de 6 horas, omita esa toma y tome la siguiente a la hora habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Intelence® son erupciones cutáneas (de leve a moderada). Comuníquelo con su médico que le indicará cómo actuar ante sus síntomas y si debe dejar de tomar INTELENCE.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los medicamentos a base de plantas y los adquiridos sin receta.

Recuerde informar a su médico o farmacéutico si empieza a tomar un nuevo medicamento mientras está tomando Intelence®.

Los siguientes medicamentos no se deben usar junto con Intelence son carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, rifampicina o productos que contienen hipérico o hierba de San Juan.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa.

Advertencias

Informe a su médico:

- Si presenta una reacción de hipersensibilidad (reacción alérgica que incluye erupción y fiebre pero también hinchazón de la cara, lengua o garganta, dificultad para respirar o tragar) que puede poner en peligro la vida. Por favor, contacte con su médico inmediatamente.
- Si tiene o ha tenido problemas de hígado, incluidas las hepatitis B y/o C.
- Si observa algún síntoma de infecciones.

Embarazo:

Si está embarazada, comuníquesele inmediatamente a su médico. Las mujeres embarazadas no deben tomar INTELENCE, salvo que se lo indique específicamente el médico

Lactancia:

Como regla general, se recomienda que las mujeres que presentan infección por VIH no alimenten a sus hijos con leche materna bajo ningún concepto, para evitar la transmisión del VIH al bebé.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**