

Kaletra® (Lopinavir/Ritonavir)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Kaletra® está indicado, en combinación con otros medicamentos antirretrovirales, para el tratamiento de adultos, adolescentes y niños mayores de 2 años infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-1).

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Kaletra® 200mg/50mg (lopinavir/ritonavir) comprimidos recubierto.

Comprimidos amarillos, marcados en relieve con el logo de Abbott y "KA".

¿Cómo se debe conservar?

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación (no superar 30°C).

¿Cómo se administra?

La dosis habitual recomendada de Kaletra® es de 400/100 mg (dos comprimidos de 200/50 mg), dos veces al día tomados con o sin alimentos.



Deben tragarse enteros, sin masticar ni chupar en la boca ni disolverlos. Se recomienda tomar siempre a las mismas horas del día.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se olvida una dosis, tómela tan pronto como le sea posible y después continúe con la dosificación normal tal y como le ha prescrito su médico. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las reacciones adversas más frecuentemente asociadas Kaletra® son: diarrea, náuseas o infección del tracto respiratorio superior.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Kaletra®. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

No tome Kaletra® con ninguno de los siguientes medicamentos: triazolam,quetiapina, cisaprida ergotamina, amiodarona, lovastatina, simvastatina alfuzosina, colchicina, sildenafil o productos que contienen hierba de San Juan (Hypericum perforatum).

Advertencias



Embarazo;

Informe a su médico inmediatamente si tiene intención de quedarse embarazada, está embarazada, piensa que puede estarlo o está dando el pecho.

Lactancia:

Kaletra® no debe utilizarse durante la lactancia. Como regla general, se recomienda que las mujeres que presentan infección por VIH no alimenten a sus hijos con leche materna bajo ningún concepto, para evitar la transmisión del VIH al bebé.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**