

Celsentri® (Maraviroc)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Celsentri® está indicado para el tratamiento de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH-1) en combinación con otros medicamentos antirretrovirales.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

CELSENTRI 150 mg comprimidos recubiertos con película.

Comprimidos recubiertos con película ovalados, biconvexos, de color azul y grabados con "MVC 150".

CELSENTRI 300 mg comprimidos recubiertos con película.

Comprimidos recubiertos con película ovalados, biconvexos, de color azul y grabados con "MVC 300".

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis recomendada es de 150mg, 300mg o 600mg dos veces al día, dependiendo del resto del tratamiento antirretroviral.

Puede tomarse con o sin alimentos.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde y para la siguiente dosis continúe con su horario habitual. Si es casi la hora de su próxima dosis, no tome la dosis olvidada. Espere a tomar la siguiente dosis a la hora que le corresponda. **No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.**

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: náuseas, vómitos, flatulencia, dolor abdominal, dolor de cabeza, hormigueo, aumento de enzimas hepáticas, erupción en la piel, pérdida de apetito, picores, cansancio, depresión e insomnio.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de estos u otros síntomas.

Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Celsentri®. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Excipientes de declaración obligatoria

Lecitina de soja, almidón glicolato de sodio, polivinilalcohol.

Advertencias

No tome Celsentri® si tiene si es alérgico al cacahuete o a la soja.



Embarazo

Sólo debe considerarse el uso de Celsentri® en el embarazo cuando los beneficios superen ampliamente el riesgo para el feto.

Lactancia

Las mujeres infectadas por el VIH no deben amamantar a sus hijos en ningún caso a fin de evitar la transmisión del VIH.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**