

ISENTRESS® (Raltegravir)



¿Qué es y para qué se utiliza?

ISENTRESS® está indicado en combinación con otros fármacos antirretrovirales para el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-1).

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

ISENTRESS® 400mg comprimido recubierto.

Comprimido recubierto con película de color rosa, que presenta forma ovalada, con la inscripción "227" grabada en una de las caras.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C). Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad. Mantener el frasco perfectamente cerrado.

¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis habitual es de 400mg (un comprimido) dos veces al día.

Se administra vía oral con o sin comidas. Se debe tomar con agua.

Deben tragarse enteros, sin masticar ni chupar en la boca ni disolverlos.

Se recomienda tomar siempre a las mismas horas del día.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis, tómela tan pronto como sea posible siempre que no hayan pasado más de 6 horas. Continúe con la siguiente dosis manteniendo el horario habitual. Si han pasado más de 6 horas desde el olvido: **NO** tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar con el tratamiento. **No tome una dosis doble para compensar un olvido.**

Si vomita transcurrida menos de 1 hora desde la toma, tome un nuevo comprimido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: disminución del apetito, problemas para dormir, comportamiento anormal y sensación de tristeza, cansancio, fiebre, mareos, dolor de cabeza y vértigo, gases, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos e indigestión y erupción cutánea.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de ISENTRESS®. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

ISENTRESS® puede interactuar con otros medicamentos como rifampicina o antiácidos que contienen aluminio y/o magnesio. Consulte a su médico o farmacéutico sobre otros antiácidos que usted pueda tomar.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa.

Advertencias

Embarazo:

No se debe utilizar Isentress® durante el embarazo.

Lactancia:

Como regla general, se recomienda que las madres infectadas por el VIH no den el pecho a sus hijos para evitar la transmisión del VIH al bebé.



**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**