

Edurant® (Rilpivirina)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Edurant® se utiliza combinado con otros medicamentos contra el VIH para tratar a adultos y adolescentes a partir de 12 años de edad infectados por el VIH y que nunca han recibido tratamiento con medicamentos contra el VIH.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Edurant® 25mg comprimido recubierto con película.

Color blanco-blancuecino, redondo, biconvexo con un diámetro de 6,4 mm, grabado en un lado del comprimido con la inscripción "TMC" y "25" en el otro lado.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar en el frasco original para protegerlo de la luz.

¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

La dosis recomendada de EDURANT es de un comprimido de 25 mg una vez al día.

Se debe tomar con una comida.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si el paciente olvida tomar una dosis de EDURANT dentro de las 12 horas desde la hora habitual de la toma, debe tomar EDURANT con una comida lo antes posible y reanudar la pauta posológica habitual.

Si el paciente olvida tomar una dosis de EDURANT y ya han transcurrido más de 12 horas desde la hora habitual de la toma, no debe tomar la dosis omitida, sino reanudar la pauta posológica habitual.

Si un paciente vomita dentro de las 4 horas desde la toma de EDURANT, debe tomar otro comprimido de EDURANT con una comida. Si un paciente vomita pasadas más de 4 horas después de la toma de EDURANT, no es necesario que el paciente tome otra dosis de EDURANT hasta la próxima dosis establecida.

No tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Edurant® se encuentran:

- alteraciones en una de las pruebas hepáticas habituales (transaminasas)
- aumento en el colesterol y/o amilasa pancreática en su sangre
- dificultad para conciliar el sueño (insomnio)
- dolor de cabeza, mareo
- náuseas

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los medicamentos a base de plantas y los adquiridos sin receta. Recuerde informar a su médico o farmacéutico si empieza a tomar un nuevo medicamento mientras está tomando Edurant®.

Los siguientes medicamentos no se deben usar junto con Edurant:

- ⬆ Rifabutina
- ⬆ Claritromicina, eritromicina
- ⬆ Antiácidos
- ⬆ Metadona
- ⬆ Dabigatrán etexilato

Informe a su médico si está siendo tratado con alguno de estos medicamentos.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Advertencias

Informe a su médico si tiene o ha tenido enfermedades del hígado, incluidas las hepatitis B y/o C, y/o enfermedades del riñón.

Informe a su médico inmediatamente si observa algún síntoma de infección.

Conducción y uso de máquinas

No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de máquinas”



Embarazo:

No debe utilizarse EDURANT durante el embarazo a no ser que sea claramente necesario.

Lactancia:

Teniendo en cuenta tanto la posibilidad de transmisión del VIH como las posibles reacciones adversas para el lactante, se debe aconsejar a las madres no continuar con la lactancia materna si están recibiendo EDURANT.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**