

Norvir® (Ritonavir)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Norvir® está indicado para el tratamiento de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH-1) en combinación con otros medicamentos antirretrovirales.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Norvir 100 mg comprimidos recubiertos

Comprimidos recubiertos con película, blancos, ovalados y marcados en relieve con el logo de Abbott y "KN".

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C). No refrigerar ni congelar. Conservar en el envase original para protegerlo de la humedad.

¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

La dosis recomendada de Norvir® es de 100mg, una o dos veces al día, dependiendo del resto del tratamiento antirretroviral. Debe tomarse CON alimentos. Los comprimidos de Norvir® se deben tragar enteros, sin masticar, romper o machacar.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si utiliza el régimen de **dos veces al día**, en caso que olvide una dosis, tómela tan pronto como sea posible junto con algún alimento, siempre que no hayan pasado más de 6 horas. Continúe con la siguiente dosis manteniendo el horario habitual. Si han pasado más de 6 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar con el tratamiento.

Si utiliza el régimen de **una vez al día**, en caso que olvide una dosis, tómela tan pronto como sea posible junto con algún alimento, siempre que no hayan pasado más de 12 horas. Continúe con la siguiente dosis manteniendo el horario habitual. Si han pasado más de 12 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar con el tratamiento.

Si vomita transcurrida menos de 1 hora desde la toma, tome un nuevo comprimido.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las reacciones adversas más frecuentes entre los pacientes que reciben Norvir® solo o en combinación con otros fármacos antirretrovirales fueron gastrointestinales (como diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal), faringitis, tos, erupción cutánea, picor, dolor de espalda y fatiga o mareos.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Muchos medicamentos pueden interferir con el efecto de Norvir®. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Algunos de los medicamentos que pueden interferir con Norvir son: alfuzosina, fentanilo, amiodarona, digoxina, teofilina, rivroxaban, trazodona, entre otros.

Advertencias

Embarazo

Sólo debe considerarse el uso de Norvir® en el embarazo cuando los beneficios superen ampliamente el riesgo para el feto.

Lactancia

Las mujeres infectadas por el VIH **NO DEBEN AMAMANTAR** a sus hijos en ningún caso a fin de evitar la transmisión del VIH.

Norvir® interacciona negativamente con los anticonceptivos orales. Por lo que, durante el tratamiento, deben utilizarse métodos anticonceptivos alternativos, eficaces y seguros

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**