

Viread[®] (Tenofovir)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Viread[®] está indicado en el tratamiento de pacientes infectados con el virus del VIH.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Viread[®] (Tenofovir) 245 mg comprimidos recubiertos.

Comprimidos de color azul claro, en forma de almendra, marcados en una de las caras con "GILEAD" y "4331" y en la otra con "300".

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico. Se administra vía oral, la dosis habitual es de un comprimido una vez al día. Deben tomarse enteras con alimentos. Se recomienda tomar siempre a las mismas horas del día.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso que olvide una dosis, si han pasado menos de 12 horas, tómela tan pronto como sea posible. Continúe con la siguiente dosis manteniendo el horario habitual. Si han pasado más de 12 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar con el tratamiento.

No tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Viread[®] se encuentran: diarrea, náuseas, vómitos, mareos, cansancio y erupción.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Viread[®]. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Excipientes de declaración obligatoria

Contiene lactosa y almidón.

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de máquinas”



Embarazo:

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico.

Lactancia:

Se ha observado que el tenofovir se excreta en la leche materna. Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento con Viread®.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**