

3,4- DIAMINOPIRIDINA

¿Qué es y para qué se utiliza?

La 3,4- diaminopiridina está indicada para la espasticidad muscular de la esclerosis múltiple, actúa aumentando la conducción de las fibras nerviosas. Actualmente no existe comercializado en España, y se prepara como fórmula magistral.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

3,4- diaminopiridina 10 mg, Capsulas rojas.
3,4- diaminopiridina 5 mg, Capsulas amarillas.

¿Cómo se debe conservar?

No requiere condiciones especiales de conservación (menos de 25°C).

¿Cómo se administra?

Tome la dosis que le prescriba su médico, las dosis se modifican según el efecto. Debe administrarse en dosis fraccionadas, tres o cuatro veces al día. Tome las cápsulas con alimentos.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvidó tomar 3,4- diaminopiridina, no tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas; continúe tomando el tratamiento según las instrucciones que le haya dado el médico

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las reacciones adversas más frecuentemente observadas en el tratamiento con 3,4- diaminopiridina: crisis epilépticas (convulsiones), asma, hormigueo y entumecimiento alrededor de la boca y en las extremidades (las manos y los pies), reducción del sentido del tacto o de las sensaciones, náuseas, mareos y aumento de la sudoración, sudores fríos.



Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento, incluidos los medicamentos obtenidos sin receta.

Advertencias

Conducción y uso de máquinas

No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección "Conducción y uso de máquinas"



Embarazo:

No debe utilizarse 3,4- diaminopiridina durante el embarazo. Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con 3,4- diaminopiridina. No existen datos clínicos adecuados para la 3,4- diaminopiridina sobre exposiciones durante el embarazo.

Lactancia:

Se desconoce si la 3,4- diaminopiridina se excreta en la leche materna.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**