



Sativex® (tetrahidrocannabinol/cannabidiol)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Sativex está indicado como tratamiento para la mejoría de los síntomas en pacientes adultos con espasticidad moderada o grave debida a la esclerosis múltiple

Nombres y presentaciones comerciales

Sativex 2,7 mg / 2,5 mg Solución para pulverización bucal.

Cada pulverización de 100 microlitros contiene: 2,7 mg de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) y 2,5 mg de cannabidiol.

Solución de color amarillo/marrón en envase pulverizador

¿Cómo se debe conservar?

Conservar en nevera (entre 2 oC y 8 oC). Una vez abierto el envase pulverizador, no es necesaria su conservación en la nevera, pero no debe conservarse a temperatura superior a 25 C. Tiene una caducidad de 42 días (6 semanas) a partir de la fecha de apertura.

Guardar en posición vertical

¿Cómo se administra?

Sativex sólo debe utilizarse por vía bucal.

Es preciso agitar el envase pulverizador antes de su uso y la pulverización debe realizarse en diferentes lugares de la superficie bucal, alternando el lugar de aplicación cada vez que se utilice el producto.

Siga las indicaciones de su médico. Es necesario un período de ajuste de la dosis para alcanzar la dosis óptima. El número de pulverizaciones debe aumentarse cada día de acuerdo con las pautas proporcionadas por su médico. La dosis de la tarde/noche debe administrarse en cualquier momento entre las 16 h y la hora de acostarse. Cuando se introduzca la dosis de la mañana, debe administrarse en cualquier momento entre la hora de levantarse y el mediodía. Deben dejarse transcurrir como mínimo 15 minutos entre cada pulverización. La dosis máxima son 12 pulverizaciones al día.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

A menudo se notifican mareos, fatiga leves o moderados. Esto suele ocurrir en las primeras semanas de tratamiento.

Uso de otros medicamentos

No tome por su cuenta ningún medicamento. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Excipientes

Etanol



Advertencias

Embarazo

Sativex no debe utilizarse durante el embarazo a menos que se considere que el beneficio del tratamiento es mayor que los riesgos potenciales para el feto y/o embrión.


Lactancia

Sativex está contraindicado durante la lactancia

Conducción y uso de máquinas

No conduzca.

Su médico le informará tras la instauración y seguimiento del tratamiento, cuando puede volver a conducir.



ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,

Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН
MEDICAMENTOS, DEVUELVALOS POR FAVOR AL
SERVICIO DE FARMACIA.**