

Fampyra® (fampridina)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Fampyra está indicado para mejorar la marcha en pacientes adultos con esclerosis múltiple con discapacidad en la marcha.

Nombres y presentaciones comerciales

Fampyra 10 mg comprimidos de liberación prolongada

Comprimido recubierto con película, ovalado, biconvexo y de color blanquecino, con un borde liso y la inscripción A10 grabada en una cara.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar por debajo de 25°C.

Conservar los comprimidos en el envase original para protegerlo de la luz y humedad.

¿Cómo se administra?

Fampyra se administra por vía oral.

El comprimido se debe tragar entero. No se debe dividir, machacar, disolver, chupar o masticar.

La dosis recomendada es un comprimido de 10 mg, dos veces al día, cada 12 horas (un comprimido por la mañana y un comprimido por la noche).

Los comprimidos se deben tomar sin alimentos.



La prescripción inicial se debe limitar a 2 semanas de tratamiento, ya que generalmente los

beneficios clínicos deben ser identificados en el plazo de 2 semanas tras comenzar Fampyra. Si no se observa ninguna mejoría, se debe suspender el tratamiento con Fampyra.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Continúe la pauta habitual. No se debe tomar una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes que puede aparecer durante el tratamiento con Fampyra son: crisis epilépticas, mareos, cefalea, trastorno del equilibrio, temblores, insomnio, ansiedad, infección en las vías urinarias, disnea, náuseas, vómitos o estreñimiento.

Uso de otros medicamentos

No tome por su cuenta ningún medicamento. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.



Advertencias

Embarazo

Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de Fampyra durante el embarazo.

Lactancia

No se recomienda utilizar Fampyra durante la lactancia.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,

Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН
MEDICAMENTOS, DEVUELVALOS POR FAVOR
AL SERVICIO DE FARMACIA.**