

## **Aubagio® (teriflunomida)**

### ***¿Qué es y para qué se utiliza?***

AUBAGIO está indicado en el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple remitente recurrente

### ***Nombres y presentaciones comerciales***

AUBAGIO 14 mg comprimidos recubiertos con película

Comprimidos pentagonales recubiertos con película, de color azul claro o azul pastel, con una impresión en un lado ('14') y un logotipo corporativo grabado en el otro lado.

### ***¿Cómo se debe conservar?***

Conservar por debajo de 25°C.

### ***¿Cómo se administra?***

La dosis habitual de AUBAGIO es de 14 mg una vez al día.

Los comprimidos recubiertos con película se administran vía oral. Los comprimidos se deben tragar enteros con agua.



AUBAGIO puede tomarse con o sin comida

### ***¿Qué hacer si se olvida una dosis?***

Continúe la pauta habitual. No se debe tomar una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

### ***¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?***

Los efectos adversos más frecuentes que puede aparecer durante el tratamiento con Aubagio son: cefalea, diarrea, náuseas, alopecia y alteraciones analíticas de las enzimas hepáticas (transaminasas).

Informe a su médico si aparece alguno de estos síntomas o cualquier otro.

### ***Uso de otros medicamentos***

No tome por su cuenta ningún medicamento. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

### ***Excipientes***

Lactosa



### **Advertencias**

#### **Embarazo**

Teriflunomida está contraindicada durante el embarazo.

#### **Lactancia**

No se debe administrar teriflunomida a las mujeres en periodo de lactancia.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,**

**Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН  
MEDICAMENTOS, DEVUELVALOS POR FAVOR  
AL SERVICIO DE FARMACIA.**