

Lonsurf® (trifluridina/tipiracil)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Lonsurf® está indicado en el tratamiento de pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Lonsurf® 15mg trifluridina/6,14mg tipiracil comprimidos.

Comprimidos recubierto blanco, redondo, grabado con "15" en un lado y "102" y "15mg" en el otro, en tinta gris.

Lonsurf® 20mg trifluridina/8,19mg tipiracil comprimidos.

Comprimidos recubierto rojo pálido, redondo, grabado con "20" en un lado y "102" y "20mg" en el otro, en tinta gris.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (por debajo de 30°C).

¿Cómo se administra?

Siga las indicaciones de su médico.

La dosis Lonsurf® en adultos es 35mg/m²/dosis (se calcula para cada paciente según su peso y altura), esta dosis se administrada dos veces al día en los días del 1 al 5 y días del 8 al 12 de cada ciclo de 28 días (4 semanas). Deberá tomar Lonsurf® dos veces al día los días marcados con una "X":



Ciclo de 28 días	Días						
Semana 1	x	x	x	x	x		
Semana 2	x	x	x	x	x		
Semana 3							
Semana 4							

Se administra vía oral. Los comprimidos deben tragarse enteros, con agua en el transcurso de 1 hora después de la finalización del desayuno y de la cena.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de que olvide una dosis de Lonsurf®, debe hablar con su médico.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a Lonsurf® se encuentran: disminución del apetito, diarrea, náuseas, vómitos, fatiga, alteraciones analíticas, insomnio, dolor de cabeza, mareos, tos y erupción de la piel, entre otros.

Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Excipientes de declaración obligatoria

Contiene lactosa y almidón.

Advertencias

Embarazo

Lonsurf® no se debe utilizar durante el embarazo a menos que las condiciones clínicas de la mujer lo requieran.

Lactancia

Se desconoce si Lonsurf® se excreta en la leche materna, se debe interrumpir la lactancia durante el tratamiento con Lonsurf®.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**