

Lamivudina/Zidovudina

¿Qué es y para qué se utiliza?

Lamivudina/zidovudina está indicado en el tratamiento de pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Lamivudina/zidovudina (150 mg de lamivudina y 300 mg de zidovudina) comprimidos recubiertos con película.

De color blanco a casi blanco, ranurados, con forma de cápsula, comprimidos biconvexos recubiertos con película, grabados con "H" en un lado y "L" y "9" separados por la línea de ranura en el otro lado

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis recomendada de Lamivudina/Zidovudina es de un comprimido dos veces al día. Lamivudina/Zidovudina puede administrarse con o sin alimentos.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde y luego continúe con su tratamiento como antes. No tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Lamivudina/Zidovudina se encuentran: dolor de cabeza, náuseas, reacción alérgica, diarrea, vómitos, dolor de estómago, pérdida de apetito, mareo, cansancio, fiebre, malestar general y tos.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Advertencias

Embarazo:

Si usted está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico para comentar los beneficios y riesgos de tomar Lamivudina / Zidovudina para usted y para su hijo.

Lamivudina / Zidovudina y medicamentos similares pueden causar efectos secundarios en el feto. Si queda embarazada mientras está tomando Lamivudina / Zidovudina, el bebé puede requerir visitas regulares (incluyendo análisis de sangre) para asegurarse de que se está desarrollando normalmente.

Lactancia:

Se recomienda que las mujeres infectadas por el VIH no den el pecho a sus hijos bajo ninguna circunstancia, con el fin de evitar la transmisión del VIH.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**