

Erelzi® (etanercept)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Erelzi® es el nombre comercial del medicamento etanercept. Está indicado en el tratamiento de artritis reumatoide, artritis psoriasica, espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial y psoriasis.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Erelzi® 50 mg solución inyectable en pluma precargada.


La solución es clara o ligeramente opalescente, de incolora a ligeramente amarillenta.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar.

Mantener las plumas precargadas en el embalaje exterior para protegerlas de la luz.

Erelzi puede ser conservado a una temperatura máxima de 25°C durante un único periodo de hasta 4 semanas; tras el cual, el medicamento no puede ser refrigerado de nuevo. Erelzi se debe desechar si no ha sido usado en las 4 semanas siguientes a su retirada de la nevera.



¿Cómo se administra?

Erelzi se administra por inyección subcutánea.

La dosis recomendada es de 50 mg por inyección subcutánea una vez a la semana.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?



Si se olvida administrarse una dosis, debería inyectarla tan pronto como usted lo recuerde. Comunique al médico los olvidos de dosis.

Instrucciones de administración de la pluma

1. Inspeccione la pluma precargada. Compruebe la fecha de caducidad en la etiqueta de la pluma precargada. Compruebe la solución: observe el medicamento en el interior de la pluma precargada. El medicamento debe ser transparente o ligeramente opalescente, incoloro o de color amarillo pálido y puede contener pequeñas partículas de proteínas blancas o casi transparentes.
2. Saque una de las plumas precargadas de la nevera y déjela a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos antes de inyectar la solución.
3. Lávese las manos antes de inyectarse el medicamento. Elija su lugar de inyección. Prepare su piel. Limpie la piel con una toallita con alcohol.
4. Retire la tapa de la aguja tirando en línea recta y deséchela. Coloque la pluma precargada en un ángulo de aproximadamente 90 grados con respecto a la piel. Empuje firmemente la pluma precargada hacia abajo en el lugar de la inyección para comenzar la inyección. El dispositivo hará clic cuando comience la inyección. Siga manteniendo la pluma precargada firmemente presionada sobre el lugar de la inyección.



1. El dispositivo hará clic por segunda vez. Después del segundo clic cuente lentamente hasta 15 para asegurarse de que la inyección se ha completado. Retire la pluma vacía de la piel.
2. Deseche la pluma vacía en un recipiente para objetos punzocortantes.

Para mayor información recomendamos ver el video demostrativo de la administración.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son: reacciones alérgicas, picor, reacciones en el lugar de la inyección, picor, fiebre e infecciones respiratorias.

Uso de otros medicamentos

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.

Advertencias



Embarazo:

Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de Erelzi en el embarazo.

Lactancia:

Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con Erelzi tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO, Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**