

Tivicay[®] **(Dolutegravir)**

¿Qué es y para qué se utiliza?

Tivicay[®] está indicado en el tratamiento de pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Tivicay[®] 50mg comprimidos recubiertos con película.

Comprimidos amarillos, redondos, grabado con "SV 572" en un lado y "50" en el otro.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis habitual de dolutegravir es de 50 mg (un comprimido) por vía oral una vez al día.

Tivicay[®] puede tomarse con o sin alimentos.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar una dosis de Tivicay, debe tomar Tivicay tan pronto como sea posible, siempre y cuando la siguiente toma no sea antes de 4 horas. Si la siguiente toma es antes de 4 horas, no debe tomar la dosis olvidada y simplemente debe seguir la pauta de dosificación habitual.

No tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Tivicay[®] se encuentran: dolor de cabeza, diarrea, náuseas, erupción, picor, vómitos, dolor de estómago, Insomnio, mareo, pesadillas, depresión, fatiga y flatulencia.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos

Los antiácidos, suplementos de calcio, los suplementos de hierro o los preparados multivitamínicos utilizados para tratar la indigestión y el ardor de estómago, pueden interrumpir la absorción de Tivicay en su cuerpo y hacer que éste sea menos eficaz. No tome estos medicamentos durante las 6 horas antes de tomar Tivicay, o por lo menos 2 horas después de tomarlo. Otros medicamentos que disminuyen la acidez, como ranitidina y omeprazol, pueden tomarse al mismo tiempo que Tivicay.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Advertencias

Embarazo:

En mujeres con capacidad de gestación, se deberá descartar la presencia de embarazo antes de iniciar el tratamiento. Las mujeres con capacidad de gestación deberán usar un método anticonceptivo eficaz durante todo el tratamiento con dolutegravir. En mujeres con capacidad de gestación que estén planeando quedarse embarazadas, se recomienda evitar el uso de dolutegravir.

En caso de que una mujer se quede embarazada durante el primer trimestre mientras está tomando dolutegravir, se deberá cambiar a otra alternativa terapéutica siempre que sea posible.

Lactancia:

Se recomienda que las mujeres infectadas por el VIH no den el pecho a sus hijos bajo ninguna circunstancia, con el fin de evitar la transmisión del VIH.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**