

## **Triumeq<sup>®</sup>** **(Dolutegravir/abacavir/lamivudina)**

### **¿Qué es y para qué se utiliza?**

Triumeq<sup>®</sup> está indicado en el tratamiento de pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

### **Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital**

Triumeq<sup>®</sup> comprimidos recubiertos con película (50 mg de dolutegravir, 600 mg de abacavir y 300 mg de lamivudina).

Comprimidos recubiertos con película ovalados, morados con " 572 Tr1 " grabado en un lado.

### **¿Cómo se debe conservar?**

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

### **¿Cómo se administra?**

Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis habitual Triumeq<sup>®</sup> (un comprimido) por vía oral una vez al día. Triumeq<sup>®</sup> puede tomarse con o sin alimentos.



### **¿Qué hacer si se olvida una dosis?**

Si olvida tomar una dosis de Triumeq<sup>®</sup>, debe tomar Triumeq<sup>®</sup> tan pronto como sea posible, siempre y cuando la siguiente toma no sea antes de 4 horas. Si la siguiente toma es antes de 4 horas, no debe tomar la dosis olvidada y simplemente debe seguir la pauta de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar un olvido.

### **¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?**

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Triumeq<sup>®</sup> se encuentran: dolor de cabeza, diarrea, náuseas, dificultar para dormir, pérdida de apetito, erupción cutánea, picor, vómitos, molestias en el estómago, indigestión, flatulencia, mareo, pesadillas, depresión, cansancio, fiebre, tos, nariz irritada, pérdida de cabello, dolores musculares y de las articulaciones, sensación de debilidad y sensación de malestar general.

Triumeq<sup>®</sup> puede producir reacción de hipersensibilidad (alérgica) al inicio del tratamiento, los síntomas son erupción cutánea con fiebre, dificultad respiratoria, dolor de garganta o tos, o náuseas o vómitos, diarrea o dolor abdominal, cansancio excesivo y dolores o malestar general.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

### **Uso de otros medicamentos**

Algunos medicamentos pueden afectar al funcionamiento de Triumeq<sup>®</sup>, o aumentar la probabilidad de sufrir efectos adversos. Triumeq<sup>®</sup> también puede afectar al funcionamiento de otros medicamentos.

No tome un antiácido, suplemento de calcio, suplemento de hierro o preparado multivitamínico durante 6 horas antes de tomar Triumeq<sup>®</sup>, o por lo menos 2 horas después de tomarlo.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

### **Advertencias**

#### **Embarazo:**

En mujeres con capacidad de gestación, se deberá descartar la presencia de embarazo antes de iniciar el tratamiento. Las mujeres con capacidad de gestación deberán usar un método anticonceptivo eficaz durante todo el tratamiento con dolutegravir. En mujeres con capacidad de gestación que estén planeando quedarse embarazadas, se recomienda evitar el uso de dolutegravir.

En caso de que una mujer se quede embarazada durante el primer trimestre mientras está tomando dolutegravir, se deberá cambiar a otra alternativa terapéutica siempre que sea posible.

#### **Lactancia:**

Se recomienda que las mujeres infectadas por el VIH no den el pecho a sus hijos bajo ninguna circunstancia, con el fin de evitar la transmisión del VIH.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**