

## **Descovy<sup>®</sup>** **(Emtricitabina / Tenofovir alafenamida)**

### **¿Qué es y para qué se utiliza?**

Descovy<sup>®</sup> es una combinación a dosis fija de emtricitabina y tenofovir. Está indicado en la terapia de combinación antirretroviral para el tratamiento de adultos y adolescentes (de 12 años de edad o mayores con un peso corporal de al menos 35kg) , infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

### **Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital**

Descovy<sup>®</sup> (contienen 200 mg de emtricitabina y 25 mg de tenofovir alafenamida).

Comprimido recubierto con película, de color azul, en forma rectangular, de dimensiones 12,5mmx6,4mm, marcado en una de las caras con "GSI" y en la otra cara del comprimido con "225".

Descovy<sup>®</sup> (contienen 200 mg de emtricitabina y 10 mg de tenofovir alafenamida).

Comprimido recubierto con película, de color gris, en forma rectangular, de dimensiones 12,5mmx6,4mm, marcado en una de las caras con "GSI" y en la otra cara del comprimido con "210".

### **¿Cómo se debe conservar?**

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C). No refrigerar ni congelar. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad. Mantener el frasco perfectamente cerrado.

### **¿Cómo se administra?**

Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis de Descovy<sup>®</sup> varía en función del tercer fármaco de la pauta de tratamiento contra el VIH:

- Atazanavir con ritonavir o cobicistat, Darunavir con ritonavir o cobicistat, Lopinavir con ritonavir: Descovy<sup>®</sup> 200/10 mg una vez al día.
- Dolutegravir, efavirenz, maraviroc, nevirapina, rilpivirina, raltegravir: Descovy<sup>®</sup> 200/25mg una vez al día.

La dosis recomendada de Descovy<sup>®</sup> es de un comprimido, tomado por vía oral, una vez al día.

Debe tomarse con o sin alimentos. El comprimido recubierto con película no se debe masticar, machacar ni partir.

### **¿Qué hacer si se olvida una dosis?**

En caso que olvide una dosis, tómela tan pronto como sea posible, siempre que no hayan pasado más de 18 horas. Continúe con la siguiente dosis manteniendo el horario habitual. Si han pasado más de 18 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar con el tratamiento.

Si vomita transcurrida menos de 1 hora desde la toma, tome un nuevo comprimido. No tome una dosis doble para compensar un olvido.

### **¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?**

Las reacciones adversas más frecuentemente asociadas con Descovy<sup>®</sup> son: náuseas, sueños anormales, dolor de cabeza, mareo, diarrea, vómitos, dolor de estómago, gases, flatulencia,

erupción y cansancio.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

### **Uso de otros medicamentos**

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Descovy®. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Es especialmente importante que le diga a su médico si está tomando otros medicamentos que puedan dañar sus riñones.

### **Advertencias**

#### **Conducción y uso de máquinas**

No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección "Conducción y uso de máquinas"



#### **Embarazo:**



No debe tomar Descovy® durante el embarazo a menos que lo haya hablado específicamente con su médico. Por lo general no se utiliza salvo que sea absolutamente necesario.

En casos necesarios, se puede considerar el uso de Descovy® durante el embarazo, hablándolo con su médico.

#### **Lactancia:**

Descovy® se excretan en la leche materna, por tanto, Descovy® no debe utilizarse durante la lactancia.

Como regla general, se recomienda que las mujeres que presentan infección por VIH no alimenten a sus hijos con leche materna bajo ningún concepto, para evitar la transmisión del VIH al bebé.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**