

Symtuza® **(Emtricitabina/cobicistat/darunavir/ tenofovir alafenamida)**



¿Qué es y para qué se utiliza?

Symtuza® es un medicamento antivírico que contiene emtricitabina, cobicistat, darunavir y tenofovir alafenamida. Se utiliza para tratar el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH 1) en adultos y adolescentes (mayores de 12 años y con un peso de al menos 35 kg).

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Symtuza® 800 mg/150 mg/200 mg/10 mg comprimidos
recubiertos con película



Comprimido recubierto con película, con forma de cápsula, de color amarillo pardo, con la inscripción «8121» en una cara y «JG» en la otra.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar en el envase original a temperatura ambiente para protegerlo de la humedad, la luz y el calor. Mantener el frasco perfectamente cerrado.

¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis recomendada habitualmente de Symtuza® es de un comprimido una vez al día en los 30 minutos posteriores a una comida. El comprimido no se debe triturar, fraccionar ni masticar.



¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis de Symtuza® y se da cuenta en el plazo de 12 horas, debe tomarlo antes posible con algún alimento y continuar con su pauta habitual de administración.

Si olvida una dosis de Symtuza® y se da cuenta en más de 12 horas y es casi la hora de su siguiente dosis, no debe tomar la dosis omitida y simplemente debe continuar la pauta habitual de administración.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento destacan: diarrea, dolor abdominal, náuseas, dolor de cabeza, exantema, anemia y cansancio.

Consulte a su médico y farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

Uso de otros medicamentos

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que toma. Recuerde informar a su médico y farmacéutico si empieza a tomar un nuevo medicamento o producto medicinal mientras está tomando Symtuza®. Algunos medicamentos pueden interferir con el efecto de Symtuza® y puede producir efectos adversos indeseados o disminuir la efectividad del tratamiento.

No tome zumo de pomelo o hierba de San Juan (hipérico) durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

No contiene.

Advertencias

Debe tener especial precaución si tiene historial de insuficiencia renal, hepática o hemofilia. También si es diabético, tiene el colesterol alto, sobrepeso y/o alérgico a sulfamidas.

Conducción y uso de máquinas

No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de máquinas”



Embarazo

No debe tomar Symtuza® durante el embarazo a menos que se lo haya indicado específicamente su médico. Si pudiera quedarse embarazada durante el tratamiento con Symtuza®, debe utilizar un método eficaz de anticoncepción.

Si se queda embarazada, o planea quedarse embarazada, pregunte a su médico acerca de los riesgos y beneficios potenciales de su terapia antirretroviral para usted y para su hijo.

Lactancia:

Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con Symtuza®. Esto se debe a que el principio activo de este medicamento pasa a la leche materna.

**ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento**

**SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBРАН MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.**